

Procedeu de cultivare a plantelor de cultură, în special de porumb și soia, care include înmuierea semințelor înainte de semănat în decurs de 2 ore și tratarea plantelor în timpul creșterii vegetative cu o soluție apoasă de 0,005% mas. a preparatului care conține, în % mas.:

tiouree	50,00
Mg(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O	20,12
Ca(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> ·4H <sub>2</sub> O	14,51
salicilat de potasiu	11,43
tetrafluoroborat de bis(dimetilgliximato)selenocarbamidă) <sub>1,4</sub>	
-(selen-selenocarbamidă) <sub>0,45</sub> -(selen-selen) <sub>0,15</sub> cobalt(III)dihidrat	1,73
([Co(DmgH) <sub>2</sub> (SeUree) <sub>2</sub> ]BF <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O)	
[Fe <sub>3</sub> O(CH <sub>3</sub> COO) <sub>6</sub> (H <sub>2</sub> O) <sub>3</sub> ]NO <sub>3</sub> ·3H <sub>2</sub> O	0,69
Mn(CH <sub>3</sub> COO) <sub>2</sub> ·4H <sub>2</sub> O	0,55
tetrafluoroborat de bis(dimetilgliximato)di(nicotinamid)cobalt(III)dihidrat ([Co(DmgH) <sub>2</sub> (Nia) <sub>2</sub> ]BF <sub>4</sub> ·2H <sub>2</sub> O)	0,36
Zn(NO <sub>3</sub> ) <sub>2</sub> ·6H <sub>2</sub> O	0,26
(NH <sub>4</sub> ) <sub>6</sub> Mo <sub>7</sub> O <sub>24</sub> ·4H <sub>2</sub> O	0,19
(HOC <sub>6</sub> H <sub>4</sub> COO) <sub>2</sub> Cu·4H <sub>2</sub> O	0,16,

totodată plantele se tratează de 2 ori cu un consum de 200...250 L/ha.