

Invenția se referă la un soi de măr (*Malus domestica Borkh.*) omologat cu denumirea Focușor, obținut la hibridarea soiurilor Wagener premiat × Calvil de zăpadă, destinat consumului în stare proaspătă. Este raionat în Republica Moldova pentru toate zonele de cultură pomicolă.

Pomul are o creștere moderată și coroană densă, sferică. Ramurile de schelet formează cu axul central unghiuri de 70...85° orientate cu vârful în sus. Gradul de înmugurire și capacitatea de a forma lăstari sunt medii. Rodește anual pe formațiuni de rod de tip țepușe, pinteni inelați și inelușe scurte.

Lăstarii au o grosime și lungime medie, culoare cafenie și sunt drepți. Lenticелеle mici și puține. Frunzele medii, ovale, scurt-acuminate, mate cu nervuri medii de culoare verde-închis. Marginea frunzei serată. Pețiolul are grosime și lungime medie fiind acoperit cu perișori. Mugurii floralii medii, alungiți. Florile de mărime medie, de culoare roz și aromate.

Fructele sunt rotunde, uniforme, cu masa de 130...150 g, pielița netedă. Culoarea de fond galbenă, iar pielița protectoare roșie ocupă toată suprafața fructului. Punctele de sub pieliță sunt de culoare gri, puține la număr. Pulpa este albă, succulentă, fină, cu aromă slabă, cu gust dulce-acriu.

Soiul se caracterizează prin rezistență medie sporită la rapăn (*Venturia inaequalis*) și făinare (*Podosphaera leucotricha*).

Recoltarea fructelor se produce la mijlocul lunii septembrie.

Nota degustației 4,7. Conținutul de substanțe uscate 13,7%, zahăr 8,63%, acizi 0,64%, substanțe tanante 8,3%, vitamina C 3,87 mg%. Capacitatea de transportare este bună.

Perioada de coacere a fructelor este toamna târziu – iarna devreme.

Pomii intră devreme pe rod. Productivitatea medie constituie 17,3...19 t/ha.