

Revendicare:

Metodă de prognozare a afecțiunilor inflamatoare latente ale urechii medii la copii în primul an de viață care include relevarea complicațiilor de sarcină, **caracterizată prin aceea că** se relevă datele privind gradul de hipotrofie a copilului, prezența afecțiunilor inflamatoare în prima lună de viață, caracterul alimentării, vârsta de gestație - săptămâni, antibioterapia în primele luni de viață și prezența infecției intrauterine, apoi se calculează coeficienții prognostici F_1 și F_2 conform formulelor:

$$F_1 = 4,9 \times GH - 0,58 \times AI + 3,2 \times CA + 0,76 \times CS + 8 \times VG + 0,8 \times A + 10,75 \times II - 176;$$

$$F_2 = 3,9 \times GH + 0,34 \times AI + 4,2 \times CA + 1,1 \times CS + 8,2 \times VG + 1,1 \times A + 9,88 \times II - 185,9$$

în care GH reprezintă gradul de hipotrofie,

AI - afecțiuni inflamatoare în primele luni de viață,

CA - caracterul alimentării,

CS - complicațiile de sarcină,

VG - vârsta de gestație,

A - antibioterapia în primele luni de viață,

II - infecția intrauterină

și în cazul în care F_1 este mai mic decât F_2 se prognozează afecțiunile inflamatoare latente ale urechii medii.