



MD 1797 F1

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Protecția Proprietății Industriale

(11) 1797 (13) F1
(51) Int. Cl.⁷: A 01 G 13/00;
A 01 F 25/00

(12) BREVET DE INVENTIE

Hotărârea de acordare a brevetului de inventie poate fi revocată în termen de 6 luni de la data publicării	
(21) Nr. depozit: a 2000 0122	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului:
(22) Data depozit: 2000.07.17	2001.12.31, BOPI nr. 12/2001
(71) Solicitant: Institutul de Fiziologie a Plantelor al Academiei de Științe a Republicii Moldova, MD	(72) Inventatori: BAJOREANU Nicolae, MD; ATIMOȘOAE Mihai, MD; TOMA Simion, MD; STRATU Radu, MD
(73) Titular: Institutul de Fiziologie a Plantelor al Academiei de Științe a Republicii Moldova, MD	

(54) Procedeu de protecție a fructelor de măr contra agentilor bolilor criptogame în timpul păstrării lor

(57) Rezumat:

1

Invenția se referă la agricultură, în special, la protecția plantelor.

Procedeul propus include tratarea pomilor fructiferi de măr peste două săptămâni după înflorire cu soluție apoașă de 0,05% a preparatului, obținut prin macerarea radicelelor semințelor crescute ale cerealelor, cu un consum total de 800...1000 L/ha.

2

Rezultatul invenției constă în sporirea rezistenței fructelor de măr în timpul păstrării lor contra agentilor bolilor criptogame.

Revendicări: 1

5

10

MD 1797 F1

3

Descriere:

Invenția se referă la agricultură, în special la protecția plantelor.

Este cunoscut procedeul de protecție a fructelor (inclusiv mere) la afectare de agenții patogeni ai bolilor criptogame, care constă în tratarea pomilor fructiferi peste 2 săptămâni după înflorire cu soluție apoasă de 0,05% de eter etilic al acidului β -naftoxiacetic [1]. Însă acest procedeu are un șir de dezavantaje: substanță sintetică posedă toxicitate de clasa 3, este costisitoare, deci procedeul este nerentabil.

Problema pe care o rezolvă invenția constă în reducerea pierderilor de fructe de măr, cauzate de agenții patogeni în timpul păstrării îndelungate.

Esența invenției constă în tratarea pomilor fructiferi peste două săptămâni după înflorire cu soluție apoasă de 0,05% a preparatului pulverulent, obținut prin macerarea semințelor crescute ale cerealelor cu un consum total de 800...1000 L/ha. Preparatul conține un complex de substanțe biologic active, extrase din colții seminali ai semințelor culturilor cerealiere (grâu, orz, secară). Colții se usucă până la umiditatea de 7...10%, apoi radicelele se separă de semințe prin macerare. Preparatul este brevetat (MD 511 C2). Semințele se utilizează pentru obținerea berii, iar radicelele (deșeurile) pentru extragerea substanțelor biologic active. Radicelele se macină până la starea de praf și se păstrează în saci de polipropilenă până la utilizare.

Utilizarea acestui procedeu contribuie la sporirea nivelului imunitar al fructelor de măr contra dezvoltării agenților patogeni în perioadele de creștere, dezvoltare și maturare.

Rezultatul invenției constă în sporirea rezistenței fructelor de măr contra agenților bolilor criptogame în timpul păstrării lor îndelungate.

Avantajele procedeului propus față de cele cunoscute: simplu în utilizare, ieftin, asigură reducerea pierderilor de fructe în timpul păstrării.

Exemple de realizare a invenției

1. Inocularea artificială a fructelor de măr cu agenții ciupercii *Penicillium expansum Link*

Fructele de măr de soiul Mantuaner, care au fost tratate peste 2 săptămâni după înflorire cu soluție apoasă a preparatului pulverulent, obținut din radicelele semințelor crescute ale cerealierelor, după recoltare au fost inoculate cu sporii celei mai răspândite și dăunătoare boli - *Penicillium expansum Link*. Pentru comparație au fost cercetate fructele tratate în perioada de vegetație cu soluție apoasă de 0,5% eter etilic al acidului β -naftoxiacetic (cea mai apropiată soluție) și martorul - fructe netratate.

Tabelul 1

Influența procedeului propus și celei mai apropiate soluții asupra rezistenței fructelor de măr de soiul Mantuaner la infectarea artificială cu agenții ciupercii *P. expansum Link*

Procedeul pentru tratarea fructelor	Timpul după inocularea artificială, zile	Mărimea suprafeței afectate, mm
Procedeul propus	10	9,9 x 8,7
	15	21,1 x 19,6
	20	34,0 x 29,9
Cea mai apropiată soluție	10	11,2 x 10,1
	15	25,1 x 22,2
	20	38,1 x 33,9
Martor	10	14,3 x 12,9
	15	39,1 x 26,4
	20	42,3 x 38,0

Din tabelul 1 rezultă că cele mai mici pierderi, provocate de sporii ciupercii *Penicillium expansum Link* după inocularea artificială s-au obținut la fructele tratate cu soluție apoasă de 0,05% a preparatului pulverulent, obținut din radicelele semințelor crescute ale cerealierelor. La sfârșitul efectuării experiențelor (după 20 zile), diferența dintre suprafețele afectate ale fructelor tratate conform procedeului propus și celui cunoscut (cea mai apropiată soluție) a constituit 4,1 x 4,0 mm, iar conform procedeului propus și martorului - 8,3 x 8,1 mm.

2. Influența tratării cu soluțiile conform procedeului propus și celei mai apropiate soluții asupra calității și capacitatei de păstrare a fructelor de măr

După efectuarea infectării artificiale, fructele de măr de soiul Mantuaner tratate cu soluții conform procedeului propus și celui cunoscut, precum și martorul au fost aşezate la păstrarea de lungă durată la temperatură de 2°C și umiditatea relativă a aerului de 85...90%.

MD 1797 F1

4

Rezultatele analizei comparative a eficacității procedeului propus și celui cunoscut asupra rezistenței fructelor la afectarea de agenții patogeni, precum și cantității de producție standard după păstrarea îndelungată sunt prezentate în tabelul 2.

Tabelul 2

5 Influența tratării cu soluții conform procedeului propus și celui cunoscut asupra calității și capacitatei de păstrare a fructelor de măr de soiul Mantuaner (term. păstrării - 150 zile)

Varianța experienței	Perisabilitatea naturală, %	Cantitatea de producție standard, %	Pierderile totale, %
Procedeul propus	6,01	96,0	10,01
Procedeul cunoscut	6,20	88,1	18,10
Martor	5,87	80,0	25,87

10 Din datele prezentate în tabelul 2 rezultă că cea mai mare cantitate de producție standard a fost obținută în varianta aplicării procedeului propus. În această variantă pierderile, provocate de agenții patogeni și perisabilitatea naturală au fost cu 8,09% mai mici comparativ cu cea mai apropiată soluție, iar cu martorul - cu 15,86%.

15 Fructele păstrate în varianta aplicării procedeului propus la sfârșitul păstrării au fost mai gustoase și capabile de a se mai păstra o perioadă de 15...20 zile.

15

(57) Revendicare:

20 Procedeu de protecție a fructelor de măr contra agenților bolilor criptogame în timpul păstrării lor, care include tratarea pomilor fructiferi cu substanță biologic activă peste două săptămâni după înflorire, caracterizat prin aceea că în calitate de substanță biologic activă se utilizează soluție apoasă de 0,05% a preparatului, obținut prin macerarea radicelelor semințelor crescute ale cerealelor, cu un consum total de 800...1000 L/ha.

25

(56) Referințe bibliografice:

1. MD 254 G2

Şef Secție:

CRASNOVA Nadejda

Examinator:

NADIOJCHINA Natalia

Redactor:

CANȚER Svetlana