

Metodă de plastie primară a buzei, nasului și maxilarului în despicăturile labio-maxilo-palatine la adolescenți, ce constă în prepararea lambourilor pe fragmentele buzei superioare despicate, unde pe fragmentul medial incizia în formă de arc începe de la jumătatea bazei columelei până la vârful arcului Cupidon, cu prelungire pe roșul buzei în formă de triunghi și în plan vertical pe mucoasă până la planșeul nazal, incizia superioară se efectuează lateral de la baza columelei la hotarul piele-mucoasă și pe planșeul nazal, iar pe fragmentul lateral incizia începe la nivelul planșeului nazal, continuă pe hotarul piele-mucoasă în jos până la viitorul vârf al arcului Cupidon, pe roșul buzei în formă de triunghi deschis lateral și apoi vertical în sus pe mucoasă până la planșeul narinei, iar la baza ei se efectuează o altă incizie în plan orizontal care în partea mediană se unește cu incizia precedentă, apoi prin acces intercartilagos se efectuează corecția septului nazal, mobilizarea mușchiului orbicular al gurii, mușchilor perinazali, suturarea buzei în trei plane, cartilajelor alare și a țesuturilor moi, caracterizată prin aceea că suplimentar pe fragmentul medial se prepară un lambou pediculat superior cu incizia ce trece anterior pe marginea columelei și aripii nazale, iar incizia posterioară continuă pe septul nazal pentru alungirea columelei, corecția aripii nazale și septului nazal, apoi se efectuează osteotomia maxilarului prin formarea unui fragment frontal osteotomic cu incizia ce trece între dinții 13 și 14, atingând marginea aperturii piriforme și îndreptată median spre marginea despicăturii, în continuare pe apofiza palatină până la unirea cu partea incipientă a inciziei, apoi fragmentul frontal se deplasează până la alipirea cu fragmentul lateral pentru închiderea defectului alveolar și se fixează cu o atelă metalică.