



MD 2156 F2 2003.05.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Protecția Proprietății Industriale

(11) 2156⁽¹³⁾ F2
(51) Int. Cl.⁷: A 01 C 1/00;
C 07 J 71/00

(12) BREVET DE INVENȚIE

Hotărârea de acordare a brevetului de invenție poate fi
revocată în termen de 6 luni de la data publicării

(21) Nr. depozit: a 2001 0244

(22) Data depozit: 2001.07.31

(41) Data publicării cererii:

2003.03.31, BOPI nr. 3/2003

(45) Data publicării hotărârii de
acordare a brevetului:

2003.05.31, BOPI nr. 5/2003

(71) Solicitant: INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A REPUBLICII MOLDOVA,
MD

(72) Inventatori: CHINTEA Pavel, MD; BALAȘOVA Natalia, RU; MAMEDOV Moboris, RU

(73) Titular: INSTITUTUL DE GENETICĂ AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A REPUBLICII MOLDOVA,
MD

(54) Procedeu de cultivare a pătlăgelelor vinete pentru semințe

(57) Rezumat:

1
Invenția se referă la agricultura, în particular la
cultura semincere a leguminoaselor și poate fi
utilizată pentru sporirea producției de semințe de
pătlăgele vinete de calitate înaltă.

Procedeul include înmuierea semințelor de
pătlăgele vinete în soluție de substanță biologic
activă, semănarea în sol protejat, transplantarea
plantulelor obținute și plantarea răsadului în faza
de 5...6 frunze la vârsta de 45...50 zile în sol
protejat.

Noutatea procedurii constă în aceea că în
calitate de substanță biologic activă se folosește

5
2
soluția apoasă de glicozidă steroică 3-O-[β-D-
glucopiranozil(1→2)]-[β-D-glucopiranozil(1→4)]-
β-D-galactopiranozid-[(25S)-5α-furostan-3β, 22α,
26-triol]-26-O-β-D-glucopiranozidă cu concentrația
de 10⁻⁵% mas., iar înmuierea semințelor de
pătlăgele vinete se efectuează timp de 12 ore.

10
Rezultatul invenției constă în sporirea produc-
tivității semincere a pătlăgelelor vinete și în
ameliorarea calității semințelor.

Revendicări: 1

15

MD 2156 F2 2003.05.31

MD 2156 F2 2003.05.31

3

Descriere:

Invenția se referă la agricultură, în particular la cultura semincere a leguminoaselor și poate fi utilizată pentru sporirea producției de semințe de pătlăgele vinete de calitate înaltă.

5 În prezent producerea semințelor de legume colecționate s-a redus semnificativ în legătură cu complexitatea tehnologiilor de obținere a lor.

Este cunoscut procedeul de producere a semințelor de pătlăgele vinete prin creșterea lor după tehnologii standarde, care include semănarea semințelor în sol protejat, transplantarea plantulelor obținute și plantarea răsadului în faza de 5...6 frunze la vârsta de 45...50 zile în sol protejat, îngrijirea plantelor [1].

10 Totuși procedeul menționat nu este suficient de eficace deoarece nu permite creșterea producției de semințe și ameliorarea calității lor.

Problema pe care o rezolvă invenția solicitată constă în sporirea volumului producției de semințe și creșterea calității lor.

15 Problema se soluționează prin procedeul propus, conform căruia semințele de pătlăgele vinete se înmoaie înainte de semănare într-o soluție de substanță biologic activă, se seamănă în sol protejat, plantulele obținute se transplantează, răsadul în faza de 5...6 frunze la vârsta de 45...50 zile se plantează în sol protejat.

Noutatea procedurii constă în faptul că în calitate de substanță biologic activă se utilizează soluția apoasă de glicozidă steroidică 3-O-[β-D-glucopirazonil(1→2)]-[β-D-glucopiranozil(1→4)]-β-D-galactopiranozid[(25S)-5α-furostan-3β,22α,26-triol]-26-O-β-D-glucopiranozidă cu concentrația de 10⁻⁵% mas., iar înmuierea semințelor de pătlăgele vinete se efectuează timp de 12 ore.

20 Glicozida steroidică 3-O-[β-D-glucopirazonil(1→2)]-[β-D-glucopiranozil(1→4)]-β-D-galactopiranozid[(25S)-5α-furostan-3β,22α,26-triol]-26-O-β-D-glucopiranozidă se obține din semințe măcinate de tomate prin fierberea lor cu alcool etilic de 70% de trei ori. Fiecare fierbere durează șase ore. Extractele etanolice se usucă, se concentrează prin distilare până la rest apos, care apoi se decantează cu cloroform de trei ori, și cu butanol de cinci ori. Extractele butanolice se usucă, se concentrează prin distilare, se spală cu acetonă și se usucă în vid. Ca rezultat se obține un praf de culoare gălbuie.

25 Rezultatul invenției constă în sporirea productivității semincere a pătlăgelelor vinete și în ameliorarea calității semințelor. Producția înaltă de semințe se asigură pe contul sporirii numărului de fructe pe o plantă, și a semințelor într-un fruct prin reducerea procentajului eliminării gameților și sporirea viabilității zigoților.

30 Procedeul se realizează în modul următor: semințele de pătlăgele vinete se mențin timp de 12 ore într-o soluție apoasă de glicozidă cu concentrația de 10⁻¹...10⁻⁶%. După ce semințele se usucă se seamănă în sol protejat. Termenele de semănare, de transplantare a răsadei, precum și schema plantării și măsurile agrotehnice sunt standarde pentru condițiile de sol protejat în regiuni de necernoziom.

Cercetările se efectuează pe pătlăgele vinete de soi *Soliaris* în condiții de seră încălzită executată din plastic pe o suprafață de 500 m². Îngrijirea plantelor include afânarea solului, plivirea, udarea.

35 Exemplu

Pentru tratarea semințelor înainte de semănare glicozida steroidică se dizolvă în apă distilată până la concentrația de 10⁻⁵%, cea mai eficientă concentrație din intervalul 10⁻¹...10⁻⁶%.

40 Semințele de pătlăgele vinete soiul *Soliaris* în săculețe din pânză de bumbac se plasează pentru 12 ore în soluția obținută la temperatura camerei. După aceasta semințele se usucă și se seamănă în sol protejat. În scopul obținerii datelor comparabile, semințele se înmoaie în soluție apoasă de glicozidă steroidică izolată din semințe de cartofi.

Observațiile asupra creșterii și dezvoltării plantelor se efectuează până la sfârșitul perioadei de vegetație. Semințele se extrag din fructele mature, se înregistrează numărul semințelor într-un fruct, precum și numărul fructelor pe o plantă. Se calculează producția de seminte (kg/m²).

45 Datele obținute sunt prezentate în următorul tabel.

Acțiunea glicozidei steroidice asupra creșterii și dezvoltării plantelor de pătlăgele vinete în condiții de sol protejat.

Tabel

Varianta experimentului	Perioada de vegetație, zile	Producția de semințe, kg/m ²	Numărul de fructe pe o plantă	Numărul de semințe într-un fruct
Standard	114	0,42	4,6	321
Glicozidă steroidică din semințe de cartofi (10 ⁻⁵ %)	115	0,46	4,2	361
Glicozidă steroidică din semințe de tomate (10 ⁻⁵ %) [*]	115	0,62	10,2	608

MD 2156 F2 2003.05.31

4

* Glicozida steroidică 3-O-[β-D-glucopirazonil(1→2)]-[β-D-glucopiranozil(1→4)]-β-D-galactopiranozid[(25S)-5α-furostan-3β,22α,26-triol]-26-O-β-D-glucopiranozidă

5 Conform datelor din tabel, procedeul propus de cultivare a pătlăgelelor vinete pentru semințe în comparație cu cel cunoscut permite sporirea numărului de fructe pe o plantă de două ori, precum și a numărului de semințe în fiecare fruct. Aceasta contribuie la creșterea producției de semințe într-un fruct de aproape două ori (190%) și la ameliorarea calității lor. Producția înaltă de semințe se asigură pe contul proprietății glicozidei steroidice de a reduce procentajul eliminării gameților feminini. De asemenea s-a stabilit că în urma tratării semințelor cu produsul respectiv în stadii postsingamice crește viabilitatea zigoților.

10

(57) Revendicare:

15 Procedeul de cultivare a pătlăgelelor vinete pentru semințe ce include semănarea semințelor în sol protejat, transplantarea plantulelor obținute și plantarea răsadului în faza de 5...6 frunze la vârsta de 45...50 zile în sol protejat, **caracterizat prin aceea că** până la semănare se efectuează înmuierea semințelor în soluție apoasă de glicozidă steroidică 3-O-[β-D-glucopirazonil(1→2)]-[β-D-glucopiranozil(1→4)]-β-D-galactopiranozid-[(25S)-5α-furostan-3β, 22α, 26-triol]-26-O-β-D-glucopiranozidă cu concentrația de 10⁻⁵ % mas. timp de 12 ore.

20

25

(56) Referințe bibliografice:

1. Справочник овощевода. Москва, Россельхозиздат, 1985, с. 160...165

Șef Secție:	GUȘAN Ala
Examinator:	BANTAȘ Valentina
Redactor:	LOZOVANU Maria