



MD 2773 F2 2005.05.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) 2773 (13) F2
(51) Int. Cl.⁷: C 07 H 1/08

(12) BREVET DE INVENȚIE

Hotărârea de acordare a brevetului de invenție poate fi revocată în termen de 6 luni de la data publicării	
(21) Nr. depozit: a 2003 0158 (22) Data depozit: 2003.06.26 (41) Data publicării cererii: 2005.01.31, BOPI nr. 1/2005	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2005.05.31, BOPI nr. 5/2005
(71) Solicitant: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD	
(72) Inventatori: POPEL Svetlana, MD; PÎRGARI Elena, MD; LEVINȚA Iurii, MD; ANDREEV Vladislav, MD; IORGA Eugen, MD	
(73) Titular: INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ȘI PROIECTĂRI TEHNOLOGICE ÎN INDUSTRIA ALIMENTARĂ A REPUBLICII MOLDOVA, MD	

(54) Procedeu de obținere a extractului de stevie**(57) Rezumat:**

1

Invenția se referă la industria alimentară, și anume la procedeele de obținere a substanțelor edulcorante din stevie.

Procedeul conform invenției include extracția glicozidelor din stevia uscată cu apă la temperatură de 80...85°C, timp de 1,0...1,5 ore, până la conținutul fracției masice de substanțe uscate de 8...10%. Extractul obținut se tratează cu acid ortofosforic sau cu acid citric la agitare până la pH 3,0...3,4 la temperatură de 60...64°C, timp de o oră. După filtrarea extractului se efectuează tratarea lui cu oxid sau hidroxid de calciu la agitare la temperatură de 50...60°C, timp de o oră până la pH 11,8...12,2. Extractul obținut se filtrează și se

5

tratează cu acid ortofosforic la temperatură de 20...30°C, timp de 2 ore până la pH 8,2...9,0, se filtrează, se neutralizează cu acid citric până la pH 4,0...4,2 și se sterilizează. Pentru obținerea extractului concentrat după neutralizarea cu acid citric până la pH 4,0...4,2 se efectuează răcirea lui până la temperatură de 2...6°C cu menținerea timp de 2 zile, decantarea sedimentului și concentrarea extractului până la conținutul fracției masice de substanțe uscate de 48...58%.

10

Rezultatul invenției constă în obținerea extractului de stevie cu un înalt grad de purificare fără utilizarea solvenților organici.

15

Revendicări: 2

MD 2773 F2 2005.05.31

3

Descriere:

Invenția se referă la industria alimentară, și anume la procedeele de obținere a substanțelor edulcorante din stevie.

Este cunoscut procedeul de obținere a compusului edulcorant sub formă de cristale din stevie prin extragerea glicozidelor cu apă fierbinte, apoi din apă cu alcanol cu cromatografie ulterioară și separarea sub formă de cristale [1]. Metoda dată necesită utilizarea la limpezire a solvenților organici, precum și a utilajului costisitor pentru separare (cromatografic, cu membrane, cu schimbători de ioni).

În calitate de cea mai apropiată soluție servește procedeul de obținere a glicozidelor sub formă de cristale [2], care prevede extracția din frunze măruntite cu apă fierbinte la temperatură de 50...95°C timp de 2...5 ore, prelucrarea extractului cu acid (citric, acetic ori fumaric) până la pH-ul de 2,0...4,0, adăugarea oxidului sau a hidroxidului de calciu până la pH-ul de 10...13, neutralizarea cu acid (acetic, fumaric sau fosforic) până la pH-ul de 7,0...7,1, prelucrarea extractului cu solvenți organici (n-butanol), separarea lichidelor imiscibile, concentrarea, apoi răcirea extractului apos, separarea și uscarea cristalelor amestecului de glicozide. Pentru înălțurarea sărurilor de calciu cristalele de glicozide se fierb în alcanol (metanol, etanol), se filtrează, se răcesc și se cristalizează a doua oară.

Dezavantajul procedeului descris este utilizarea la etapa finală de limpezire pentru înălțurarea sărurilor de calciu a solventului organic (metanol, etanol), ceea ce duce la scumpirea produsului de bază.

Problema pe care o rezolvă invenția este obținerea unui edulcorant sub formă de concentrat, constituit din amestec de glicozide dulci de stevie (cu conținut de substanțe biologic active, vitamine, aminoacizi), fără utilizarea solvenților organici.

Problema se soluționează prin aceea că procedeul de obținere a extractului de stevie propus include extracția glicozidelor din stevia uscată cu apă la temperatură de 80...85°C, timp de 1,0...1,5 ore, până la conținutul fracției masice de substanțe uscate de 8...10%; tratarea extractului obținut cu acid ortofosforic sau cu acid citric la agitare la temperatură de 60...64°C până la pH-ul de 3,0...3,4 timp de o oră; filtrarea extractului și tratarea filtratului cu oxid sau hidroxid de calciu la agitare la temperatură de 50...60°C, timp de o oră până la pH-ul de 11,8...12,2; filtrarea și tratarea extractului obținut cu acid ortofosforic la agitare la temperatură de 20...30°C, timp de 2 ore, până la pH-ul de 8,2...9,0; filtrarea, neutralizarea cu acid citric până la pH-ul de 4,0...4,2 și sterilizarea extractului obținut.

Procedeul se realizează astfel.

Extractul de stevie după neutralizarea cu acid citric până la pH-ul de 4,0...4,2 se răcește până la temperatură de 2...6°C, menținându-se la această temperatură timp de 2 zile, se decantează sedimentul și se concentrează extractul până la conținutul fracției masice de substanțe uscate de 48...58%.

Frunzele de stevie uscate și măruntite se supun extracției apoase la temperatură de 80...85°C timp de 1,0...1,5 ore până la conținutul fracției masice de substanțe uscate de 8...10%. Pentru înălțurarea impurităților metalice, proteice și colorante valoarea pH-ului se micșorează cu soluție de acid ortofosforic sau citric până la 3,0...3,4, se expune la agitare timp de o oră la temperatură de 62±2°C, extractul se filtrează printr-un strat de materiale de filtrare auxiliare (perlit, kiselgur). Extractul parțial limpezt se prelucrează cu var proaspăt stins, până la pH-ul de 22,8...12,2, se expune la agitare continuă timp de o oră la temperatură de 55±5°C și se filtrează. Pentru înălțurarea surplusului de săruri de calciu extractul se prelucrează cu soluție de acid ortofosforic până la pH-ul 8,2...9,0, se agită minuțios, apoi se expune timp de 2 ore la temperatură 20...30°C și se filtrează. Fosfații greu solubili formați în rezultatul unei asemenea tratări se sedimentează practic pe deplin, sedimentul se înălțură prin decantare cu filtrarea ulterioară printr-un strat de perlit sau kiselgur.

Extractul se normalizează cu soluție de acid citric până la pH-ul de 4,0...4,2, se ambalează în recipiente și se sterilizează.

Pentru fabricarea concentratului de extract de stevie, extractul obținut poate fi răcit până la temperatură de 2...6°C cu menținerea timp de 7 zile pentru înălțurarea suplimentară a sărurilor de calciu. Extractul tratat se concentrează până la conținutul fracției masice de substanțe uscate de 48...58%, se ambalează în recipiente și se ermetizează.

Particularitatea distinctivă a procedeului o constituie faptul că substanțele edulcorante din stevie se utilizează sub formă de extract (ce conține în afară de glicozide, care determină gustul dulce, și aminoacizi, vitamine, polifenoli, elemente minerale) și, de asemenea, faptul că surplusul de săruri de calciu se înălțură cu acid ortofosforic la pH-ul de 8,2...9,0.

Datele experimentale privind gradul de limpezire a extractului de stevie cu acid ortofosforic la diferite valori ale pH-ului sunt prezentate în tabel.

MD 2773 F2 2005.05.31

Tipul extractului	pH	Conținutul în extract de stevie, mg-ekv/L de:	
		calcium	calcium+magneziu
Extractul după limpezire cu oxid de calciu	12,0	152	206
Extractul după tratare cu acid ortofosforic	9,5	37	49
	9,2	23	30
	8,9	22	29
	8,3	20	27
	8,0	23	30
	7,6	26	34
	7,1	30	40
	6,5	41,5	54

Din datele prezentate rezultă că gradul de limpezire a extractului de stevie de săruri de calciu depinde de pH, și anume în intervalul declarat al pH-ului conținutul sărurilor de calciu este mai mic.

5 Înlocuirea solvenților organici costisitori și toxici cu H_3PO_4 permite de a ieftini tot procesul tehnologic.

Rezultatul inventiei constă în obținerea extractului de stevie cu un înalt grad de purificare fără utilizarea solvenților organici.

10 Exemple concrete de realizare

Exemplul 1

Frunzele de stevie uscate și mărunțite, până la fracția cu mărimea de 3...7 mm, sunt supuse extracției cu apă în extractorul cu flux continuu la temperatură de 80°C timp de o oră până la conținutul fracției masice de substanțe uscate de 8%. Extractul obținut de culoare cafenie închisă și netransparent se tratează cu soluție de acid citric cu concentrația de 50% până la pH-ul de 3, 4, se menține la temperatură de 60°C timp de o oră cu agitare continuă, apoi se filtrează. Extractul se tratează cu oxid de calciu până la pH-ul de 12,2 fiind permanent agitat, la temperatură de 50°C timp de o oră.

20 Filtratul obținut se tratează cu soluție de acid ortofosforic cu concentrația de 3,0 M/dm³ până la pH-ul de 8,2, se amestecă minuțios, se menține timp de 2 ore la temperatură de 20°C, se filtrează prin strat de perlit sau kiselgur. Extractul se normalizează cu soluție de acid citric cu concentrația de 50% până la pH-ul de 4,0, se ambalează în recipiente cu capacitatea de 350 cm³ și 3000 cm³, se sterilizează timp de 12 și respectiv, 60 min, la temperatură de 85°C.

Exemplul 2

25 Frunzele de stevie uscate și mărunțite, până la fracția cu mărimea de 3...7 mm, sunt supuse extracției cu apă în extractorul cu flux continuu la temperatură de 85°C timp de o oră până la conținutul fracției masice de substanțe uscate de 10%. Extractul obținut de culoare cafenie închisă, netransparent se tratează cu soluție de acid citric cu concentrația de 50% până la pH-ul de 3,0, se menține la temperatură de 64°C timp de o oră fiind agitat continuu, apoi se filtrează. Extractul se tratează cu oxid de calciu până la pH-ul de 11,8, fiind permanent agitat, la temperatură de 60°C timp de o oră.

30 Filtratul obținut se tratează cu soluție de acid ortofosforic cu concentrația de 3,0 M/dm³ până la pH-ul de 9,0, se amestecă minuțios, se menține timp de 2 ore la temperatură de 30°C, se filtrează printr-un strat de perlit sau kiselgur, se normalizează cu soluție de acid citric până la pH-ul de 4,2. Extractul se răcește până la temperatură de 2°C, se menține la temperatură dată timp de 2 zile, se decantează de pe sediment, se concentrează până la conținutul fracției masice de substanțe uscate de 48...58%, se ambalează în recipiente și se ermetizează.

Așadar, procedeul permite obținerea extractului de stevie cu un grad înalt de limpezire, care conține glicozide, ce posedă un gust dulce.

35 Punerea în aplicare a inventiei va permite utilizarea extractului nemijlocit în calitate de edulcorant la fabricarea produselor alimentare de larg consum, precum și pentru diabetici.

40

MD 2773 F2 2005.05.31

5

(57) Revendicări:

- 5 1. Procedeu de obținere a extractului de stevie, care include extracția glicozidelor din stevia uscată cu apă la temperatura de 80...85°C până la conținutul fracției masice de substanțe uscate de 8...10%, tratarea extractului obținut cu acid ortofosforic sau cu acid citric la agitare până la pH 3,0...3,4 la temperatura de 60...64°C, timp de o oră, filtrarea și tratarea filtratului cu oxid sau hidroxid de calciu până la pH 11,8...12,2 la agitare la temperatura de 50...60°C, timp de o oră, filtrarea și tratarea filtratului cu acid ortofosforic la agitare până la pH 8,2...9,0 la temperatura de 20...30°C, timp de 2 ore, filtrarea, neutralizarea cu acid citric până la pH 4,0...4,2 și sterilizarea extractului obținut.
- 10 2. Procedeu conform revendicării 1, care include opțional răcirea extractului obținut după neutralizarea cu acid citric până la pH 4,0...4,2 până la temperatura de 2...6°C cu menținerea timp de 2 zile, decantarea sedimentului și concentrarea extractului până la conținutul fracției masice de substanțe uscate de 48...58%.
- 15

(56) Referințe bibliografice:

1. US 4082858 1979.04.04
2. US 4599403 1985.10.07

Şef Secţie: GUŞAN Ala

Examinator: BAZARENCO Tatiana

Redactor: LOZOVANU Maria