

Metodă de tratament al mastopatiei difuze, care constă în aceea că inițial pe parcursul a 5...6 săptămâni se prescrie o dietă macrobiotică cu limitarea grăsimilor și a proteinelor animale, totodată pe parcursul primelor 7...10 zile se administrează un sorbent de 3 ori pe zi în cantitate eficientă cu 1 oră înainte de masă *per os*, după aceasta pe fondul dietei se administrează un probiotic de 2-3 ori pe zi în timpul mesei în cantitate eficientă pe parcursul a 3...4 săptămâni, după finisarea dietei, în ziua a 9-a...a 13-a a ciclului menstrual, se efectuează testarea prin electroacupunctură cu biorezonanță cu aplicarea electrozilor cu plăci pe palmele, tălpile pacientei și aplicarea electrozilor magnetici pe glandele mamare, se acționează asupra pacientei cu unde electromagnetice de 1...1000 Hz și densitatea fluxului de putere de 1,0...1,2 mW/cm<sup>2</sup>, se determină frecvența de biorezonanță a undelor, care duce la apariția efectelor biologice, apoi, timp de 17 min, se acționează cu unde de frecvență determinată asupra regiunii glandelor mamare cu alternarea perioadelor de excitare de 3 s și de relaxare de 1 s, după care se face înregistrarea câmpului electromagnetic al pacientei prin intermediul unor inductori magnetici timp de 3 min pe un purtător inert, care se administrează în cantitate eficientă pe parcursul a 2...3 săptămâni de 1...3 ori pe zi sublingual, seria de tratament cu unde electromagnetice incluzând 2...3 ședințe la un interval de 3 săptămâni.