

Invenția se referă la medicină, în special la oncologia ginecologică.

Esența metodei de tratament diferențiat al cancerului endometrial constă în aceea că se stabilește stadiul bolii, gradul de diferențiere, nivelul de invazie miometrială, se determină nivelul triptofanhidroxilazei-1. În cazul în care nivelul triptofanhidroxilazei-1 este mai înalt de 13,8 unități convenționale, iar la paciente se stabilește stadiul bolii IA, IB, gradul de diferențiere 1, 2 și 3, invazie miometrială mai puțin de 50% sau stadiul IC, gradul de diferențiere 1 și 2 și invazie miometrială mai mult de 50%, se efectuează histerectomia totală cu salpingooforectomie bilaterală. În cazul în care nivelul triptofanhidroxilazei-1 variază de la 3,6 până la 13,8 unități convenționale, după histerectomie, suplimentar, se indică două serii de chimioterapie cu Cisplatină – 100 mg/m<sup>2</sup> în perfuzie timp de 4 ore, o dată la serie și concomitent se indică hormonoterapie cu Depoprovera – 500 mg, intramuscular, o dată pe săptămână și antiestrogenoterapie cu Tamoxifen – 20 mg/zi, seria constituind 3 luni cu interval de 3 săptămâni între serii.

Revendicări: 1