



MD 3582 F1 2008.05.31

REPUBLICA MOLDOVA



**(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală**

(11) 3582 (13) F1

**(51) Int. Cl.: A01G 7/06 (2006.01)
A0IP 21/00 (2006.01)
A0IN 43/08 (2006.01)
A0IN 43/12 (2006.01)
C07J 71/00 (2006.01)**

(12) BREVET DE INVENȚIE

Hotărârea de acordare a brevetului de inventie poate fi revocată în termen de 6 luni de la data publicării	
(21) Nr. depozit: a 2007 0282 (22) Data depozit: 2007.10.16	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2008.05.31, BOPI nr. 5/2008
(71) Solicitant: INSTITUTUL DE GENETICĂ ȘI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD	
(72) Inventatori: BUJOREANU Nicolae, MD; CHINTEA Pavel, MD; RALEA Tudor, MD; CHIRILOV Eleonora, MD; ȘVEȚ Stepan, MD; HAREA Ion, MD	
(73) Titular: INSTITUTUL DE GENETICĂ ȘI FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A MOLDOVEI, MD	

(54) Procedeu de tratare a mărului

(57) Rezumat:

1

Invenția se referă la agricultură, în special la pomicultură, și anume la un procedeu de tratare a mărului.

Procedeul, conform invenției, constă în tratarea extraradiculară a mărului după înflorire cu soluție apoasă de glicozidă steroidică de 0,0005% cu formula: 3-O-{-[α -L-ramnopiranozil(1 \rightarrow 2)]-[α -L-ramnopira-

5 2

nozil(1 \rightarrow 4)]- β -D-glucopiranozidă}-[(25S)-5 α -furostan-3 β , 22 α , 26-triol]-26-O- β -D-glucopiranozidă cu un consum de 800...1000 L/ha.

Rezultatul constă în sporirea productivității pomilor fructiferi.

Revendicări: 1

10

MD 3582 F1 2008.05.31

3

Descriere:

Invenția se referă la agricultură, în special la pomicultură, și anume la un procedeu de tratare a mărului.

Este cunoscut procedeul de prelucrare a culturilor pomicole după înflorire cu soluție apoasă de 3,5 dioxo-4-propionilciclohexancarboxilat de calciu (preparatul Regalis) în concentrație de 0,0125%, cu un consum de 800...1000 L/ha, care frânează procesele de creștere și sporește productivitatea pomilor fructiferi. Însă acest procedeu are și unele dezavantaje: preparatul sus-menționat este sintetic, are un grad de toxicitate de clasa 3, are preț de cost și consum prea mare la 1 ha de livadă [1].

Problema pe care o rezolvă invenția propusă constă în sporirea productivității pomilor de măr.

Esența invenției constă în tratarea extraradiculară a pomilor de măr după înflorire cu soluție apoasă de glicozidă steroidică de 0,0005% cu formula $3-O-\{[-\alpha-L-ramnopiranozil(1 \rightarrow 2)]-\alpha-L-ramno-piranozil(1 \rightarrow 4)\}-\beta-D-glucopiranozidă\}-(25S)-5\alpha-furostan-3\beta, 22\alpha, 26-triol]-26-O-\beta-D-glucopiranozidă$ cu un consum de 800...1000 L/ha.

Preparatul Nicotianozidă Furo este obținut din semințe de *Nicotiana Tabacum L.* (Швец С.А., Кинтя П.К., Гуцу О.Н., Гришковец В.И. Стероидные гликозиды семян *Nicotiana Tabacum L.* Строение никотианозидов С и F. Журнал «Химия природных соединений», Ташкент, 1995, № 3, стр. 396-401).

Rezultatul invenției constă în sporirea productivității pomilor fructiferi.

Avantajele procedeului propus față de cele cunoscute constau în aceea că substanța utilizată în procedeul propus este de proveniență naturală, inofensivă sănătății omului și mediului înconjurător, ieftină și cu un consum foarte mic la aplicare.

Exemplu de realizare a invenției.

În livada de meri, pomii de soiul Generos au fost tratați după înflorire cu soluția apoasă de Nicotianozidă Furo în concentrație de 0,0005% cu un consum de 800...1000 L/ha. Pentru comparație, tot în aceeași zi, pomii de soiul Generos au fost tratați cu soluția apoasă de 0,0125% a preparatului indicat în cea mai apropiată soluție, iar cei din varianta martor – cu apă.

Rezultatele obținute sunt prezentate în tabel.

Influența preparatul Nicotianozidă Furo asupra productivității pomilor de măr soiul Generos

Nr. d/o	Varianta experimentului	Numărul de fructe pe un pom, buc.	Greutatea fructelor pe un pom, kg	Roadă, q/ha
1	*Nicotianozidă Furo 0,0005%	61,7±2,1	10,7±1,6	89,8±4,2
2	Regalis 0,0125%	57,7±8,1	9,69±1,3	80,7±9,4
3	Martor	49,7±1,8	8,53±1,3	71,0±2,8

* Soluția propusă

Din datele prezentate în tabel se constată că în urma utilizării substanței Nicotianozidă Furo, atât numărul de fructe pe un pom (61,7 buc.) și greutatea lor (10,78 kg), cât și cantitatea totală a producției la 1 ha (89,8 q), a fost mai sporită în comparație cu cea mai apropiată soluție și cu varianta martor.

Astfel, tratarea extraradiculară după înflorire a pomilor fructiferi de soiul Generos cu substanță biologic activă de proveniență naturală Nicotianozidă Furo a condus la stabilizarea proceselor fizioleice în plante pe parcursul perioadei de vegetație și la sporirea volumului de producție.

40

MD 3582 F1 2008.05.31

4

(57) Revendicări:

Procedeu de tratare a mărului care include tratarea extrarădiculară a pomilor după înflorire cu o substanță biologic activă cu un consum de 800...1000 L/ha, caracterizat prin aceea că în calitate de substanță biologic activă se utilizează soluția apoasă de 0,0005% de glicozidă steroidică cu formula $3-O-\{[-\alpha-L-ramnopiranozil(1 \rightarrow 2)]-\alpha-L-ramnopiranozil(1 \rightarrow 4)\}-\beta-D-glucopiranozidă\}-(25S)-5\alpha-furostan-3\beta, 22\alpha, 26-triol] - 26-O-\beta-D-glucopiranozidă$.

10

(56) Referințe bibliografice:

1. MD 2438 G2 31.12.2004

Şef Secție:

COLESNIC Inesa

Examinator:

GORDIENCO Maria

Redactor:

UNGUREANU Mihail