

Invenția se referă la tulpinile de microalge producătoare de substanțe bioactive, în special la tulpina algei verzi *Haematococcus pluvialis* Flotow, care poate fi utilizată în biotehnologie pentru obținerea astaxantinei.

Astaxantina – pigment din grupa carotenoizilor, este unul din cei mai de valoare antioxidanți, cunoscuți în prezent. Activitatea antioxidantă a acestei substanțe este net superioară, comparativ cu cea a unor astfel de antioxidanți recunoscuți ca tocoferolul, acidul ascorbic, β -carotenu, lycopina ș.a.

Privită din perspectiva contracarării stresului oxidativ, care conform concepției contemporane prezintă un mecanism patofiziologic de bază, comun unui număr mare de maladii, astaxantina este un compus valoros, care poate fi utilizat în tratamentul afecțiunilor cardiovasculare, cancerului, tulburărilor neurologice și imune, diabetului zaharat, ischemiei, bolilor Alzheimer, Parkinson, etc., precum și pentru încetinirea îmbătrânirii organismului în ansamblu.

La etapa actuală, ca sursă de astaxantină sunt considerate un număr restrâns de microorganismе, dintre care drojdia *Phaffia rhodozyma* [1] și *Agrobacterium aurantiacum* [2].

Dezavantajele acestor tulpini sunt cantitatea mică de astaxantină și cheltuielile mari pentru cultivare. Astfel *Phaffia rhodozyma* conține 30...800 mg de astaxantină la kg de biomasă absolut uscată (adică până la 0,08%), iar *Agrobacterium aurantiacum* – 30...120 mg de astaxantină la kg de biomasă absolut uscată (adică până la 0,12%).

Este cunoscută tulpina *Haematococcus pluvialis* Flotow CNMN-AV-05 [3].

Dezavantajul acestei tulpini este productivitatea mică, și anume 1,32 g/l de biomasă absolut uscată (BAU).

Problema pe care o rezolvă prezenta invenție constă în obținerea unei tulpini noi de *Haematococcus pluvialis*, care ar asigura o productivitate mai sporită de biomasă cu un conținut suficient de astaxantină și minimum de cheltuieli pentru cultivare.

Esența invenției constă în aceea că se propune tulpina de algă *Haematococcus pluvialis* Flotow CNMN-AV-07 în calitate de sursă de astaxantină.

Productivitatea de biomasă a tulpinii de algă *Haematococcus pluvialis* Flotow cu numărul CNMN-AV-07 este 3,0 g/l față de 1,32 g/l cea mai apropiată soluție și conține 2,4% astaxantină. Astfel, la cultivarea noii tulpini se obțin 3,0 g/l de biomasă cu un conținut de 2,4% de astaxantină, ceea ce în valori absolute constituie 72 mg. În cazul celei mai apropiate soluții acest indice constituie 44,9 mg.

Rezultatul constă în sporirea productivității algei și a cantității de astaxantină.

Tulpina propusă a fost colectată dintr-un bazin acvatic artificial din apropierea satului Căpriană.

În cultură algologic pură tulpina se multiplică intens pe mediul mineral lichid RD cu următoarea componență a macroelementelor (g/l): NaNO_3 – 0,3; KH_2PO_4 – 0,02; K_2HPO_4 – 0,08; NaCl – 0,02; CaCl_2 – 0,05; $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ – 0,01; $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ – 0,0001; $\text{MnSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ – 0,0015; $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ – 0,00008; H_3BO_3 – 0,0003; $(\text{NH}_4)_6\text{MoO}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ – 0,0003; $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ – 0,0175; $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ – 0,0002; EDTA – 0,0075.

În condiții obișnuite de cultivare tulpina respectivă are o productivitate de 3,0 g/l cu un conținut de astaxantină de 2,4% din biomasă absolut uscată.

Caractere morfo-culturale ale tulpinii

Haematococcus pluvialis Flotow CNM-AV-07 este o algă verde monocelulară. Structura celulară a *Haematococcus pluvialis* se aseamănă cu cea a majorității algelor monocelulare din ordinul *Volvocales*. În dependență de etapa de dezvoltare, forma și dimensiunile celulelor variază.

În condiții optimale de creștere celulele vegetative verzi au formă sferică spre elipsoidală cu diametrul între 8...20 μm înconjurată de o membrană netedă, îndepărtată de protoplast, fiind acoperite de o matrice extracelulară gelatinoasă de o grosime variabilă. Din partea posterioară a protoplastului pleacă 2 flageli izoconți de lungime egală cu cea a corpului celular. Cromatoforul parietal în formă de pară sau cupă, foarte fin reticulat, este străbătut de protoplasmă hialină. Nucleul este mare, dispus central, cu un singur nucleol și nu este atașat de flageli. Pe parcursul dezvoltării alga trece ușor în formă palmeloidă, celulele mobile își pierd flagelii și devin celule vegetative în stare de repaus, fiind înconjurată de un strat mucozitar cu grosimea de $5,8 \pm 0,10 \mu\text{m}$. În condiții de iluminare excesivă celulele vegetative se transformă în ciști roșii – aplanospori. La această etapă celulele acumulează o cantitate masivă de astaxantină în picături de lipide din citoplasmă. Când condițiile devin favorabile aplanosporii revin la forma vegetativă.

Caractere fiziologo-biochimice

Tulpina microalgei verzi *Haematococcus pluvialis* Flotow CNMN-AV-07 crește bine pe mediul RD, componența căruia a fost menționată mai sus. Temperatura optimă este de 25...27°C, pH 7,0. Intensitatea optimă a luminii este de 1500...3000 lx.

Tulpina este sensibilă la variația condițiilor de cultivare.

În condiții favorabile de existență se caracterizează printr-o productivitate de 3 g/l biomasă absolut uscată. Biomasă absolut uscată de *Haematococcus pluvialis* Flotow CNMN-AV-07 are conținutul de astaxantină de 2,4%.

Gradul de puritate a tulpinii

Tulpina a fost obținută prin metoda „picăturii suspendate” în cultură algologic pură și acumulată în mediul lichid și agarizat RD. La cultivarea în masă poate fi infectată cu alge și cianobacterii. Contaminarea poate fi evitată prin respectarea condițiilor aseptice.

Exemplu de realizare a invenției

În vase de cultură cu volumul de 1 litru în mediul mineral lichid cu următoarea componență a microelementelor (g/L): NaNO_3 – 0,3; KH_2PO_4 – 0,02; K_2HPO_4 – 0,08; NaCl – 0,02; CaCl_2 – 0,05; $\text{MgSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ – 0,01; $\text{ZnSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$ – 0,0001; $\text{MnSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ – 0,0015; $\text{CuSO}_4 \cdot 5\text{H}_2\text{O}$ – 0,00008; H_3BO_3 – 0,0003; $(\text{NH}_4)_6\text{MoO}_{24} \cdot 4\text{H}_2\text{O}$ –

0,0003; $\text{FeCl}_3 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ – 0,0175; $\text{Co}(\text{NO}_3)_2 \cdot 6\text{H}_2\text{O}$ – 0,0002; EDTA – 0,0075, pH 7,0, pregătit pe apă distilată, se introduce inoculum de 0,3 g/l calculat pentru biomasă absolut uscată. Cultivarea se realizează la intensitatea luminii de 1500 lx timp de 10 zile, după care 5 zile la intensitatea luminii de 3000 lx, la temperatura de 25...27°C. În ziua a 15-a productivitatea ajunge până la 3 g/l de biomasă absolut uscată, ce conține 2,4% astaxantină.