

Invenția se referă la microbiologie și biotehnologie, și anume la o tulpină de microalgă cianofită, care poate fi utilizată în industriile microbiologică, farmaceutică, cosmetologie, de asemenea în zootehnie și fitotehnie.

Este cunoscută utilizarea tulpinii de algă cianofită azotfixatoare *Calothrix elenkinii* în calitate de sursă de substanțe biologice active cum sunt proteine, lipide și glucide [1].

Dezavantajul acestei tulpini constă în faptul că ea conține cantități mai reduse de lipide, până la 20% BAU.

Cea mai apropiată după esența tehnică și rezultatul obținut este tulpina de algă cianofită *Nostoc flagelliforme* [2].

Dezavantajul acestei tulpini constă în faptul că și ea conține cantități mai reduse de lipide (17,40% BAU) și glucide (25,12% BAU).

Problema pe care o rezolvă prezenta invenție constă în obținerea unei tulpini noi de microalgă cianofită *Nodularia harveyana* (Thwaites) Thuret. care ar asigura o cantitate mai sporită de lipide și glucide.

Tulpina de microalgă cianofită *Nodularia harveyana* (Thwaites) Thuret. este depozitată în Colecția Națională de Microorganisme Neapatogene a Republicii Moldova sub numărul CNMN-CB-12 și poate fi utilizată în calitate de sursă de proteine, lipide și glucide.

Rezultatul tehnic al invenției constă în faptul că biomasa tulpinii de algă cianofită *Nodularia harveyana* (Thwaites) Thuret. este un material biotehnologic valoros, ce conține o cantitate mai sporită de lipide (21,30% BAU) și glucide (40,00% BAU) în comparație cu prototipul care conține o cantitate de lipide și glucide mai redusă – (lipide (17,40% BAU) și glucide (25,12% BAU)).

Rezultatul tehnic obținut se datorește particularităților biochimice ale tulpinii în special sintezei lipidelor și a glucidelor.

Tulpina *Nodularia harveyana* (Thwaites) Thuret.- este o microalgă cianofită azotfixatoare care vegetează în solurile a Republicii Moldova. Tulpina a fost obținută de Alina Trofim în anul 2012 din probele de sol s. Vladimirovca, raionul Slobozia prin metoda însămânțării repetate pe medii lichide și agarizate.

Pentru creșterea și dezvoltarea tulpinii poate fi utilizat mediul mineral Drew cu următoarea componență chimică:  $K_2HPO_4$  - 0,2 g/l;  $MgSO_4 \times 7H_2O$  - 0,2 g/l;  $CaCl_2 \times 2H_2O$  - urme;  $FeCl_3$  - urme. Mediul este preparat pe apa distilată. De asemenea tulpina crește pe extras apos din sol obținut în raport de 1:5. Cultivarea se efectuează cu menținerea următorilor condiții: temperatura de +23... 25°C, iluminare de 1000...3000 lux. Durata cultivării este de 12...15 zile. Tulpina se caracterizează prin sinteza cantităților sporite de glucide - (40,00% BAU) și lipide - (21,30% BAU).

Caracteristica morfo-culturală a tulpinii: *Nodularia harveyana* (Thwaites) Thuret. este o algă cianofită care se dezvoltă pe sol. Reprezintă colonii de culoare verde - albăstrui cu trihomi drepți sau puțin încovoiați cu lățimea de 4,0...8,2  $\mu$ , prevăzute cu teacă gelatinoasă foarte fină, care adesea se descompune. Celulele vegetative sunt discoidale, uneori pătrate, cu lungimea de 2,3...4,0  $\mu$ , puțin strangulate în zona pereților despărțitori. Heterociștii sunt sferici de obicei mai mari de cât celulele vegetative. Sporii sunt de la început înguști, apoi sferici cu o membrana cafenie – gălbuie, ei se amplasează în șirag de la 2 până la 16 și au diametrul de 6,0...8,0  $\mu$ . În condiții nefavorabile toate celulele vegetative se transformă în spori.

Caracterele fiziologo-biochimice ale tulpinii noi *Nodularia harveyana* (Thwaites.) Thuret. Substanțele biologice active ce intră în componența tulpinii date sunt: proteine – 35,84%; lipide – 21,30%; glucide – 40,00%.

Tulpina crește bine pe mediul mineral Drew cu următoarea componență chimică:  $K_2HPO_4$  - 0,2 g/l;  $MgSO_4 \times 7H_2O$  - 0,2 g/l;  $CaCl_2 \times 2H_2O$ - urme;  $FeCl_3$  - urme, de asemenea se dezvoltă pe extract apos din sol în raport de 1:5. Cultivarea se efectuează cu menținerea următorilor parametri: temperatura de +23...30°C, iluminare de 1000...3000 lux. Durata cultivării este de 12...20 zile. Tulpina *Nodularia harveyana* (Thwaites.) Thuret. se păstrează pe mediu nutritiv Drew sau extract apos. Termenul de păstrare nu este limitat, însă se cere reînsămânțarea în a 15...20 zi de cultivare.

Gradul de puritate a tulpinii: Tulpina nouă de algă cianofită *Nodularia harveyana* (Thwaites.) Thuret. este selectată în cultură algologic pură. Pentru menținerea purității, cultura se recultivă pe medii agarizate în cutii Petri sau colbe la aceeași temperatură și iluminare. Pe medii agarizate, cât și lichide, reînsămânțarea tulpinii se recomandă de două ori pe lună. Când biomasa atinge cota de 2,0 g/l o parte din ea se înlătură prin filtrare și se adaugă mediu nutritiv nou, readucând suspensia la concentrația inițială.

#### Exemplu de realizare a invenției:

Într-un vas cu volumul de 250 ml cu mediul nutritiv lichid Drew cu următoarea componență chimică:  $K_2HPO_4$  - 0,2 g/l;  $MgSO_4 \times 7H_2O$  - 0,2 g/l;  $CaCl_2 \times 2H_2O$  - urme;  $FeCl_3$  - urme, se inoculează biomasa algologic pură de algă cianofită *Nodularia harveyana* (Thwaites.) Thuret. în cantitate de 0,4 g/l. Cultivarea are loc la temperatura de +23...30°C în decurs de 15 zile, după ce biomasa algală se colectează. Biomasa algei *Nodularia harveyana* (Thwaites.) Thuret. conține proteine – 35,84% BAU; lipide – 21,30% BAU; glucide – 40,00% BAU și poate fi valorificată în industria microbiologică.