



MD 2084 C2 2003.01.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Protecția Proprietății Industriale

(11) 2084 (13) C2
(51) Int. Cl.⁷: G 01 N 33/14

(12) BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. depozit: a 2001 0344 (22) Data depozit: 2001.07.19	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2003.01.31, BOPI nr. 1/2003
<p>(71) Solicitanți: BAEV Oleg, MD; MENCER Emanuil, MD; FROLOVA Janna, MD; MOGHILKIN Victor, MD</p> <p>(72) Inventatori: BAEV Oleg, MD; MENCER Emanuil, MD; FROLOVA Janna, MD; MOGHILKIN Victor, MD</p> <p>(73) Titulari: BAEV Oleg, MD; MENCER Emanuil, MD; FROLOVA Janna, MD; MOGHILKIN Victor, MD</p>	

(54) Metodă de evaluare a calității divinurilor

(57) Rezumat:

1

Invenția se referă la industria vinicolă și a divinurilor, și anume la evaluarea calității divinurilor.

Metoda de evaluare a calității divinurilor include analiza cantitativă și organoleptică a compoziției lor cu determinarea alcoolului etilic, zaharurilor, densității optice, extractului secnereducător, substanțelor tanante, ligninei, vanilinelui, compușilor și elementelor toxice: alcoolului metilic, fierului, cuprului, plumbului, cadmiului, arsenului, mercurului, zincului, conținutului etilcaprilatului, etilcaprinatului, etillaurinatului, gradului de oxidare a substanțelor tanante, evaluarea organoleptică a calității în puncte și determinarea calității divinurilor conform calcului indicelui generalizat al calității D ($0 < D \leq 1$):

5

10

15

2

$D = \sqrt[4]{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4}$, în care D_1 este indicele compoziției fizico-chimice a divinurilor, care include gradul de influență a fiecărui indice asupra calității lor, limitele admisibile de concentrații, D_2 – indicele calității care include evaluarea organoleptică a divinurilor, punctajul fiind exprimat într-un sistem zecimal, recalculat în sistemul universal de măsură, D_3 – indicele de tipicitate a divinurilor, D_4 – gradul de toxicitate și puritate ecologică.

Reendicări: 1

MD 2084 C2 2003.01.31

3

Descriere:

Invenția se referă la industria vinicolă și a divinurilor, anume la evaluarea calității divinurilor.

Este cunoscută metoda de evaluare a calității divinurilor [1], care prevede determinarea conținutului de lignină (x₁) în ele, a sumei de substanțe tanante (x₂), componentelor principale ale "eterului enanic" (x₃), alcoolului izoamilic (x₇), vanilinelui (x₄), extractului redus, hidroxililor pirogalici (x₈), calcularea raporturilor între concentrația ligninei și suma substanțelor tanante (x₅), concentrația ligninei și vanilină (x₆), concentrația extractului redus și componentele principale ale "eterului enanic" (x₉), concentrația extractului redus și vanilină (x₁₀) și calcularea punctajului estimativ al divinurilor prin formulele:

$$Y = 17,153 + 30,350x_1 - 30,673x_2 + 49,958x_3 + 169,050x_4 - 11,142x_5 + 0,020x_6;$$
$$Y = 8,324 - 1,370x_1 + 0,362x_2 + 107,15x_4 + 0,0199x_6 - 5,860x_8 - 0,0009x_{10};$$
$$Y = 10,448 + 3,875x_1 - 2,112x_2 - 20,100x_4 - 1,082x_5 - 0,0087x_6 + 0,050x_7 + 0,0001x_9.$$

Însă, această metodă este aditivă, ea nu diferențiază indicii compozitionei fizico-chimice după gradul influenței lor asupra calității divinurilor și nu permite calcularea punctajului estimativ pentru verificarea obiectivității aprecierii prin degustare.

Este cunoscută o metodă mult mai obiectivă de sinteză a indicelui generalizat al calității unui anumit produs, care prezintă funcția D (0 ≤ D ≤ 1), la baza căreia stă principiul multiplicativ și nicidcum cel aditiv de sinteză [2].

Însă, numărul limitat al funcțiilor de transformare a indicilor în criterii proprii și lipsa maselor lor reduce substanțial valoarea acestei abordări.

Cea mai apropiată de metoda revendicată este metoda de evaluare a calității divinurilor, actualmente în vigoare, care prevede analiza fizico-chimică și gazocromatografică cu determinarea cantitativă a fracției volumetrice de alcool etilic, a densității optice, a concentrațiilor masice de zahăr recalculate pentru cel invertit, de extract redus, substanțe tanante, lignină, vanilină, alcool metilic, fier, cupru, a fracțiilor masice de plumb, cadmiu, arsen, mercur, zinc, și aprecierea organoleptică a divinurilor în puncte [3].

Însă, sistemul zecimal în vigoare de evaluare a calității divinurilor este subiectiv, întrucât el depinde de sensibilitatea senzorială a membrilor comisiei de degustare, și imperfect. Deși acest sistem prevede aprecierea transparenței (până la 0,5 puncte), colorației (până la 0,5 puncte), buchetului sau aromei (până la 3,0 puncte), gustului (până la 5,0 puncte), totuși el folosește metoda aditivă de combinare a acestor indici, ceea ce conduce la suprapunerea punctajelor nesatisfăcătoare ale unor indici cu punctaje mult mai înalte ale altor indici, astfel reducând nivelul de informativitate a punctajului general. Mai mult decât atât, în cadrul determinării calității divinurilor punctajul estimativ este diferențiat în raport cu vârsta lor. Fiecare an al vîrstei divinurilor îi revin aproximativ 0,1...0,3 puncte, în care este foarte dificil de a cuprinde informația obținută la degustare. De asemenea, din cauza numărului impunător de indici ai compozitionei fizico-chimice, este complicată argumentarea punctajului organoleptic estimativ obținut, comparându-l vizual cu conținutul cantitativ al unor componente anumite. În legătură cu aceasta apare necesitatea prelucrării matematice a întregii informații obținute și unificării ei într-un singur indice obiectiv care să coreleze strict cu calitatea divinurilor.

Problema pe care o rezolvă metoda revendicată este elaborarea unui indice obiectiv unic, care să cuprindă un maxim de informație privind compozitiona fizico-chimică, gradul de toxicitate și de puritate ecologică, tipicitatea și caracteristicile organoleptice ale divinului.

Eseanța inventiei constă în aceea că metoda de evaluare a calității divinurilor include analiza cantitativă și organoleptică a compozitionei lor cu determinarea alcoolului etilic, zaharurilor, densității optice, extractului sec nereducațor, substanțelor tanante, ligninei, vanilinelui, compușilor și elementelor toxice: alcoolului metilic, fierului, cuprului, plumbului, cadmiului, arsenului, mercurului, zincului, conținutului etilcaprilatului, etilcaprinatului, etillaurinatului, gradului de oxidare a substanțelor tanante, evaluarea organoleptică a calității în puncte și determinarea calității divinurilor conform calcului indicelui generalizat al calității D (0 < D ≤ 1), nouătatea constând în aceea că gradul de oxidare a substanțelor tanante se determină prin prezența hidroxililor pirogalici, suplimentar se determină conținutul alcoolului β-feniletilic, radionucliziilor de cesiu Cs¹³⁷, radionucliziilor de strониу Sr⁹⁰ și rapoartele componentelor: substanțe tanante față de lignină, hidroxili pirogalici față de substanțe tanante, iar indicele generalizat al calității D (0 < D ≤ 1) se calculează conform formulei: $D = \sqrt[4]{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4}$, în care

D₁ - indicele compozitionei fizico-chimice a divinurilor (0 < D₁ ≤ 1),

D₂ - indicele calității (0,2 < D₂ ≤ 1),

D₃ - indicele de tipicitate a divinurilor (0 < D₃ ≤ 1),

D₄ - indicele compozitionei fizico-chimice a divinului după conținutul impurităților toxice (0 < D₄ ≤ 1), și în funcție de valorile indicelui D se constată calitatea divinului:

0...0,199 - foarte proastă

0,200...0,369 - proastă

0,370...0,629 - satisfăcătoare

MD 2084 C2 2003.01.31

4

- 0,630...0,799 - bună
0,800...1,000 - foarte bună.

5 D_1 este indicele compoziției fizico-chimice a divinurilor ($0 < D_1 \leq 1$), bazat pe gradul de influență a componentelor asupra calității divinurilor, conținutul optim, extremele admisibile de variație a valorilor lor, și

determinat prin formula:

$$D_1 = \sqrt[m]{\prod_{i=1}^m d_i^{\beta_i}},$$

în care m este numărul indicilor unificați ai compoziției fizico-chimice Y_i , β_i – gradul de influență (importanță) a indicelui i asupra calității alcoolurilor și distilatelor, d_i – criteriul particular (adimensional) al calității fiecărui indice i ($0 < d_i \leq 1$), care se determină conform uneia din următoarele legi de transformare, exprimate prin formulele:

10
$$d = 1 - e^{-e^{\left[9\left(\frac{c-Y}{c-b}\right)^{\alpha}-2\right]}}, \quad d = e^{-e^{\left[9\left(\frac{Y-b}{c-b}\right)^{\alpha}-2\right]}}, \quad d = 1 - e^{-e^{\left[9\left(\frac{Y-e}{f-e}\right)^{\alpha}-2\right]}}, \quad d = e^{-e^{\left[9\left(\frac{f-Y}{f-e}\right)^{\alpha}-2\right]}},$$

în care Y este indicele compoziției fizico-chimice, $(b ; c)$ sau $(e ; f)$ – domeniul de modificare a lui, α – parametrul determinant al vitezei de modificare a funcției d ;

D_2 este indicele calității ($0,2 < D_2 \leq 1$) ce constituie o funcție adimensională rezultată din evaluarea organoleptică în puncte a calității alcoolurilor și distilatelor, determinat prin formula:

15
$$D_2 = 0,2 + 0,8 \cdot \left(e^{-e^{\left[9\left(\frac{Z-b}{c-b}\right)^{\alpha}-2\right]}} \right),$$

în care Z este punctajul organoleptic estimativ, $(b ; c)$ – domeniul de modificare a lui, α – parametrul determinant al vitezei de modificare a funcției, care depind de grupa de vârstă (marca) a divinului evaluat;

D_3 este indicele de tipicitate a divinurilor ($0 < D_3 \leq 1$) determinat prin formula:

$$D_3 = \sqrt[p]{\prod_{k=1}^p g_k^{\beta_k}},$$

20 în care p este numărul de indici unificați de tipicitate X_i , β_k – gradul de influență (importanță) indicelui k asupra tipicității divinului, g_k – criteriul particular (adimensional) al tipicității fiecărui indice k ($0 < g_k \leq 1$), care se determină conform uneia din următoarele legi de transformare, exprimate prin formulele:

$$g = 1 - e^{-e^{\left[9\left(\frac{c-X}{c-b}\right)^{\alpha}-2\right]}}, \quad g = e^{-e^{\left[9\left(\frac{X-b}{c-b}\right)^{\alpha}-2\right]}}, \quad g = 1 - e^{-e^{\left[9\left(\frac{X-e}{f-e}\right)^{\alpha}-2\right]}}, \quad g = e^{-e^{\left[9\left(\frac{f-X}{f-e}\right)^{\alpha}-2\right]}},$$

în care X este indicele de tipicitate, $(b ; c)$ sau $(e ; f)$ – domeniul de modificare a lui, α – parametrul determinant al vitezei de modificare a funcției g ;

25 D_4 este indicele compoziției fizico-chimice a divinului după conținutul impurităților toxice ($0 < D_4 \leq 1$), bazat pe extremele admisibile de variație a valorilor lor și determinat prin formula:

$$D_4 = \sqrt[n]{\prod_{j=1}^n h_j},$$

30 în care n este numărul indicilor unificați ai compoziției fizico-chimice după conținutul impurităților toxice W_j , h_j – criteriul particular (adimensional) al conținutului de impuritate toxice pentru fiecare indice j ($0 < h_j \leq 1$), care se determină conform uneia din următoarele legi de transformare, exprimate prin formulele:

$$h = 1 - e^{-e^{\left[9\left(\frac{c-W}{c-b}\right)^{\alpha}-2\right]}}, \quad h = e^{-e^{\left[9\left(\frac{W-b}{c-b}\right)^{\alpha}-2\right]}}, \quad h = 1 - e^{-e^{\left[9\left(\frac{W-e}{f-e}\right)^{\alpha}-2\right]}}, \quad h = e^{-e^{\left[9\left(\frac{f-W}{f-e}\right)^{\alpha}-2\right]}},$$

în care W este indicele de puritate ecologică după conținutul de impurități toxice, $(b ; c)$ sau $(e ; f)$ – domeniul de modificare a lui, α – parametrul determinant al vitezei de modificare a funcției h .

35 Indicii adăugați la metoda cunoscută [1] oferă o informație mai amplă privind compoziția divinului, care ar fi fost incompletă în lipsa acestora. Componentele principale ale “eterului enanic”: etilcaprilat, etilcaprinat, etillaurinat, determinate prin metoda gazocromatografică, constituie specificul divinurilor, mai ales al coniacurilor franceze, și influențează substanțial la formarea buchetului și gustului. Caracteristicile organoleptice ale divinurilor depind esențial de indicele – gradul de oxidare al substanțelor tanante, care se manifestă prin prezența hidroxiliilor pirogalici, întrucât ei caracterizează intensitatea proceselor de oxidoreducere care au loc și influențează considerabil asupra modificării calității produsului. Conținutul cantitativ al alcoolului β -fenyletilic corelează strict cu vârsta divinurilor,

40 întrucât crește împreună cu mărirea termenului de maturizare a distilatelor de vin pentru divin și participă la formarea buchetului, atribuindu-le nuanțe compuse plăcute de flori. De asemenea corelează strict cu vârsta distilatelor de vin

MD 2084 C2 2003.01.31

5

pentru divin și a divinurilor raportul între substanțele tanante și lignină și raportul între hidroxilii pirogalici și substanțele tanante, care caracterizează procesele de maturizare a distilatelor de vin pentru divin și influențează în mare măsură calitatea divinurilor. Informația despre gradul de puritate ecologică a divinurilor, caracterizată prin prezența compușilor și elementelor toxice, actualmente este insuficientă fără determinarea radionucliziilor de Cs¹³⁷ și radionucliziilor de Sr⁹⁰. După analiza fizico-chimică și gazocromatografică divinurile se supun analizei organoleptice prin degustare cu apreciere conform sistemului estimativ zecimal.

Pe baza informației privind compoziția fizico-chimică care determină aroma și gustul divinurilor D_1 , privind tipicitatea lor D_3 , gradul de toxicitate și puritatea ecologică D_4 , precum și a informației despre caracteristicile organoleptice ale divinurilor D_2 , prin formula $D = \sqrt[4]{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4}$ se calculează indicele generalizat al calității

- 10 D. Această informație caracterizează într-o formă expresă calitatea divinurilor exprimată printr-un sistem de valori prezentat în tab. 1.

Tabelul 1

*Sistemul de valori ale indicilor de calitate
(D, D₁, D₂, D₃, D₄, d, h, g)*

Valori	Calitate
0...0,199	foarte proastă
0,200...0,369	proastă
0,370...0,629	satisfăcătoare
0,630...0,799	bună
0,800...1,000	foarte bună

- 15 Astfel, cu ajutorul unei analize fizico-chimice mai detaliate, aprecierii organoleptice în puncte și calculării indicelui generalizat al calității care unifică aceste date după principiul multiplicativ și care de asemenea este bazat pe corelarea și gradul de influență (importanță) a componentelor asupra calității produselor, tipicitate și gradul de toxicitate și puritatea ecologică, este posibil de a efectua o evaluare mai obiectivă a calității divinurilor.

- 20 Rezultatul metodei revendicate este elaborarea unui indice generalizat al calității divinurilor care se bazează pe compoziția fizico-chimică, tipicitatea lor, aprecierea organoleptică, gradul de toxicitate și de puritate ecologică, calculat conform unui program de calculator și folosit pentru evaluarea obiectivă a calității acestor produse imediat sau la cupajarea lor conform programelor de calculator și pentru selectarea compoziției necesare a divinurilor, asigurând tipicitatea lor și o calitate superioară stabilă.

- 25 Realizarea metodei este prezentată în exemplele 1 și 2.

Exemplul 1. Pentru determinarea indicelui generalizat al calității conform metodei revendicate și conform metodei cunoscute [1] s-a selectat divinul "Barza Albă" de vîrstă 4,5...5 ani produs de fabrica "KVINT".

Tabelul 2

30 Compoziția fizico-chimică și calitatea divinului "Barza Albă"

Denumirea indicelui	Metoda cunoscută	Metoda revendicată
Fracția volumetrică de alcool etilic, % vol.	40,0	40,0
Conținutul de zahăr, g/dm ³	14,1	14,1
Densitatea optică, E ⁰	0,5	0,5
Vîrstă, ani	4,48	4,48
Concentrația masică a extractului redus, g/dm ³	0,98	0,98
Concentrația masică a substanțelor tanante, g/dm ³	0,28	0,28
Concentrația masică a ligninei, g/dm ³	0,14	0,14
Concentrația masică a vanilinelui, g/dm ³	2,2	2,2
Concentrația masică a componentelor principale ale "eterului enanic", mg/dm ³	–	19,3
Concentrația masică a hidroxililor pirogalici, mg/dm ³	–	42
Gradul de oxidare a substanțelor tanante, g/dm ³	–	15,0
Concentrația masică a fierului, mg/dm ³	0,1	0,1
Concentrația masică a cuprului, mg/dm ³	2,4	2,4

MD 2084 C2 2003.01.31

6

Fracția masică de plumb, mg/kg	0	0
Fracția masică de cadmiu, mg/kg	0	0
Fracția masică de arsen, mg/kg	0	0
Fracția masică de mercur, mg/kg	0	0
Fracția masică de zinc, mg/kg	0,44	0,44
Concentrația masică a alcoolului metilic, g/dm ³	0,2	0,2
Concentrația masică de radionuclizi de Ce ¹³⁷ , Bk/L	–	0
Concentrația masică de radionuclizi de Sr ⁹⁰ , Bk/L	–	0
Concentrația masică a alcoolului β-feniletic, mg/dm ³	–	1,9
Raportul c.mas. a substanțelor tanante la c.mas. a ligninei	–	2,0
Raportul c.mas. a hidroxililor pirogalici la c.mas. a substanțelor tanante	–	0,150
Aprecierea organoleptică, puncte *)	8,43	8,43
Indicele fizico-chimic al compozitiei divinului D_1	–	0,867
Indicele calității divinului D_2	–	0,930
Indicele tipicității divinului D_3	–	0,992
Indicele toxicității D_4	–	1,000
Indicele generalizat al calității $D = \sqrt{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4}$	–	0,946
Indicele generalizat al calității exprimat în puncte	–	8,44

Notă: pentru divinurile de vârstă 4,5...5 ani evaluarea organoleptică conform metodei cunoscute [1] oscilează în limitele a 8,3...8,6 puncte.

Tabelul 3

Legile de transformare $d = f(Y)$, $g = f(X)$, $h = f(W)$ pentru divinul "Barza Albă"

Denumirea indicilor W , X , Y , Z , domeniile de modificare a lor, criteriile speciale ale calității lor d , h , g și greutate β		Legile de transformare $d = f(Y)$, $g = f(X)$, $h = f(W)$																		
$Y_1 - \text{alcool etilic, \%}$		$\beta_1 = 1,0$																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Y_1</td> <td style="width: 10%;">d_1</td> <td style="width: 80%;"> $d_1 = \exp \left\{ - \exp \left\{ - \left[9 \left(\frac{Y_1 - 39,6}{0,4} \right)^{0,681} - 2 \right] \right\} \right\}, 39,6 \leq Y_1 \leq 40,0;$ $d_1 = \exp \left\{ - \exp \left\{ - \left[9 \left(\frac{40,4 - Y_1}{0,4} \right)^{0,681} - 2 \right] \right\} \right\}, 40,0 < Y_1 \leq 40,4.$ </td> </tr> <tr> <td>< 39,6</td><td>0,001</td><td></td></tr> <tr> <td>39,7</td><td>0,8</td><td></td></tr> <tr> <td>40,0</td><td>1,0</td><td></td></tr> <tr> <td>40,3</td><td>0,8</td><td></td></tr> <tr> <td>> 40,4</td><td>0,001</td><td></td></tr> </table>		Y_1	d_1	$d_1 = \exp \left\{ - \exp \left\{ - \left[9 \left(\frac{Y_1 - 39,6}{0,4} \right)^{0,681} - 2 \right] \right\} \right\}, 39,6 \leq Y_1 \leq 40,0;$ $d_1 = \exp \left\{ - \exp \left\{ - \left[9 \left(\frac{40,4 - Y_1}{0,4} \right)^{0,681} - 2 \right] \right\} \right\}, 40,0 < Y_1 \leq 40,4.$	< 39,6	0,001		39,7	0,8		40,0	1,0		40,3	0,8		> 40,4	0,001		
Y_1	d_1	$d_1 = \exp \left\{ - \exp \left\{ - \left[9 \left(\frac{Y_1 - 39,6}{0,4} \right)^{0,681} - 2 \right] \right\} \right\}, 39,6 \leq Y_1 \leq 40,0;$ $d_1 = \exp \left\{ - \exp \left\{ - \left[9 \left(\frac{40,4 - Y_1}{0,4} \right)^{0,681} - 2 \right] \right\} \right\}, 40,0 < Y_1 \leq 40,4.$																		
< 39,6	0,001																			
39,7	0,8																			
40,0	1,0																			
40,3	0,8																			
> 40,4	0,001																			
$Y_2 - \text{conținutul de zahăr, g/dm}^3$		$\beta_2 = 1,0$																		
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 10%;">Y_2</td> <td style="width: 10%;">d_2</td> <td style="width: 80%;"> $d_2 = \exp \left\{ - \exp \left\{ - \left[9 \left(\frac{Y_2 - 12,5}{2,5} \right)^{0,587} - 2 \right] \right\} \right\}, 12,5 \leq Y_2 \leq 15,0;$ $d_2 = \exp \left\{ - \exp \left\{ - \left[9 \left(\frac{17,5 - Y_2}{2,5} \right)^{0,587} - 2 \right] \right\} \right\}, 15,0 < Y_2 \leq 17,5.$ </td> </tr> <tr> <td>< 12,5</td><td>0,001</td><td></td></tr> <tr> <td>13</td><td>0,8</td><td></td></tr> </table>		Y_2	d_2	$d_2 = \exp \left\{ - \exp \left\{ - \left[9 \left(\frac{Y_2 - 12,5}{2,5} \right)^{0,587} - 2 \right] \right\} \right\}, 12,5 \leq Y_2 \leq 15,0;$ $d_2 = \exp \left\{ - \exp \left\{ - \left[9 \left(\frac{17,5 - Y_2}{2,5} \right)^{0,587} - 2 \right] \right\} \right\}, 15,0 < Y_2 \leq 17,5.$	< 12,5	0,001		13	0,8											
Y_2	d_2	$d_2 = \exp \left\{ - \exp \left\{ - \left[9 \left(\frac{Y_2 - 12,5}{2,5} \right)^{0,587} - 2 \right] \right\} \right\}, 12,5 \leq Y_2 \leq 15,0;$ $d_2 = \exp \left\{ - \exp \left\{ - \left[9 \left(\frac{17,5 - Y_2}{2,5} \right)^{0,587} - 2 \right] \right\} \right\}, 15,0 < Y_2 \leq 17,5.$																		
< 12,5	0,001																			
13	0,8																			

MD 2084 C2 2003.01.31

7

15	1,0	
17	0,8	
> 17,5	0,001	
$Y_3 - \text{densitatea optică}$		$\beta_3 = 0,8$
Y_3	d_3	$d_3 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{Y_3 - 0,25}{0,25} \right)^{0,587} - 2 \right] \right\} \right\}, 0,25 \leq Y_3 \leq 0,5;$ $d_3 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{0,75 - Y_3}{0,25} \right)^{0,587} - 2 \right] \right\} \right\}, 0,5 < Y_3 \leq 0,75 .$
< 0,25	0,001	
0,3	0,8	
0,5	1,0	
0,7	0,8	
> 0,75	0,001	
$Y_4 - \text{vârstă, ani}$		$\beta_4 = 0,8$
Y_4	d_4	$d_4 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{Y_4 - 4,40}{0,10} \right)^{1,363} - 2 \right] \right\} \right\}, 4,40 \leq Y_4 \leq 4,50 ;$ $d_4 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{4,55 - Y_4}{0,05} \right)^{1,927} - 2 \right] \right\} \right\}, 4,50 < Y_4 \leq 4,55 .$
< 4,40	0,001	
4,45	0,8	
4,50	1,0	
> 4,55	0,001	
$Y_5 - \text{conținutul de extract redus, g/dm}^3$		$\beta_5 = 1,0$
Y_5	d_5	$d_5 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{Y_5 - 0,45}{0,35} \right)^{0,686} - 2 \right] \right\} \right\}, 0,45 \leq Y_5 \leq 0,8 ;$ $d_5 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{1,90 - Y_5}{1,1} \right)^{0,557} - 2 \right] \right\} \right\}, 0,80 < Y_5 \leq 1,9 .$
< 0,45	0,001	
0,5	0,5	
0,8	1,0	
1,8	0,5	
> 1,90	0,001	
$Y_6 - \text{conținutul de substanțe tanante, g/dm}^3$		$\beta_6 = 1,0$
Y_6	d_6	$d_6 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{Y_6 - 0,15}{0,15} \right)^{0,860} - 2 \right] \right\} \right\}, 0,15 \leq Y_6 \leq 0,3 .$
< 0,15	0,001	
0,2	0,8	
> 0,3	1,0	
$Y_7 - \text{conținutul de lignină, g/dm}^3$		$\beta_7 = 1,0$
Y_7	d_7	$d_7 = 1 - \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{0,15 - Y_7}{0,15} \right)^{1,616} - 2 \right] \right\} \right\}, 0 < Y_7 \leq 0,15 .$
0	0,001	
0,10	0,8	
> 0,15	1,0	
$Y_8 - \text{conținutul de vanilină, mg/dm}^3$		$\beta_8 = 0,4$
Y_8	d_8	$d_8 = 1 - \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{3,0 - Y_8}{2,9} \right)^{1,668} - 2 \right] \right\} \right\}, 0,1 \leq Y_8 \leq 3,0 .$

MD 2084 C2 2003.01.31

< 0,1	0,001	
2,0	0,8	
> 3,0	1,0	
$Y_9 - \text{conținutul de componente principale ale "eterului enantic", mg/dm}^3$		$\beta_9 = 0,6$
Y_9	d_9	$d_9 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{Y_9 - 6}{14} \right)^{1,927} - 2 \right] \right\} \right\}, 6 \leq Y_9 \leq 20 ;$ $d_9 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{24 - Y_9}{4} \right)^{1,927} - 2 \right] \right\} \right\}, 20 < Y_9 \leq 24 .$
< 6	0,001	
20	1,0	
> 24	0,001	
$Y_{10} - \text{gradul de oxidare a substanțelor tanante, g/dm}^3$		$\beta_{10} = 0,6$
Y_{10}	d_{10}	$d_{10} = 1 - \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{Y_{10} - 8}{12} \right)^{1,616} - 2 \right] \right\} \right\}, 8 \leq Y_{10} \leq 20 .$
< 8	1,0	
12	0,8	
> 20	0,001	
$Z - \text{evaluarea organoleptică, puncte;}$		$D_2 = 0,2 + 0,8 \cdot D'_2$
Z	D'_2	$D'_2 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{Z - 8,3}{0,3} \right)^{0,860} - 2 \right] \right\} \right\}, 8,3 \leq Z \leq 8,6$
< 8,3	0,001	
8,4	0,8	
> 8,6	1,0	
$X_1 - \text{conținutul de alcool } \beta\text{-feniletilic, mg/dm}^3$		$\beta_1 = 0,8$
X_1	g_1	$g_1 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{X_1 - 1,5}{0,5} \right)^{1,927} - 2 \right] \right\} \right\}, 1,5 \leq X_1 \leq 2,0 ;$ $g_1 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{2,5 - X_1}{0,5} \right)^{1,927} - 2 \right] \right\} \right\}, 2,0 < X_1 \leq 2,5 .$
< 1,5	0,001	
2,0	1,0	
> 2,5	0,001	
$X_2 - \text{raportul substanțelor tanante față de lignină}$		$\beta_2 = 1,0$
X_2	g_2	$g_2 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{X_2 - 1,5}{0,5} \right)^{1,927} - 2 \right] \right\} \right\}, 1,5 \leq X_2 \leq 2,0 ;$ $g_2 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{2,5 - X_2}{0,5} \right)^{1,927} - 2 \right] \right\} \right\}, 2,0 < X_2 \leq 2,5 .$
< 1,5	0,001	
2,0	1,0	
> 2,5	0,001	
$X_3 - \text{raportul hidroxililor pirogalici față de substanțele tanante}$		$\beta_3 = 0,6$
X_3	g_3	$g_3 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{X_3 - 0,145}{0,005} \right)^{1,927} - 2 \right] \right\} \right\}, 0,145 \leq X_3 \leq 0,150 ;$ $g_3 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{0,160 - X_3}{0,010} \right)^{1,927} - 2 \right] \right\} \right\}, 0,150 < X_3 \leq 0,160 .$
< 0,145	0,001	
0,150	1,0	
> 0,160	0,001	

MD 2084 C2 2003.01.31

$W_1 - \text{conținutul de fier, mg/dm}^3$		
W_1	h_1	$h_1 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{1,6 - W_1}{1,4} \right)^{0,506} - 2 \right] \right\} \right\}, \quad 0,2 \leq W_1 \leq 1,6.$
< 0,2	1,0	
1,5	0,5	
> 1,6	0,001	
$W_2 - \text{conținutul de cupru, mg/dm}^3$		
W_2	h_2	$h_2 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{5,1 - W_2}{2,6} \right)^{0,410} - 2 \right] \right\} \right\}, \quad 2,5 \leq W_2 \leq 5,1.$
< 2,5	1,0	
5,0	0,5	
> 5,1	0,001	
$W_3 - \text{conținutul de plumb, mg/kg}$		
W_3	h_3	$h_3 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{0,31 - W_3}{0,31} \right)^{0,389} - 2 \right] \right\} \right\}, \quad 0 < W_3 \leq 0,31.$
0	1,0	
0,3	0,5	
> 0,31	0,001	
$W_4 - \text{conținutul de cadmiu, mg/kg}$		
W_4	h_4	$h_4 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{0,031 - W_4}{0,031} \right)^{0,389} - 2 \right] \right\} \right\}, \quad 0 < W_4 \leq 0,031.$
0	1,0	
0,03	0,5	
> 0,031	0,001	
$W_5 - \text{conținutul de arsen, mg/kg}$		
W_5	h_5	$h_5 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{0,21 - W_5}{0,21} \right)^{0,439} - 2 \right] \right\} \right\}, \quad 0 < W_5 \leq 0,21.$
0	1,0	
0,2	0,5	
> 0,21	0,001	
$W_6 - \text{conținutul de mercur, mg/kg}$		
W_6	h_6	$h_6 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{0,006 - W_6}{0,006} \right)^{0,746} - 2 \right] \right\} \right\}, \quad 0 < W_6 \leq 0,006.$
0	1,0	
0,005	0,5	
> 0,006	0,001	
$W_7 - \text{conținutul de zinc, mg/kg}$		
W_7	h_7	$h_7 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{10 - W_7}{9,5} \right)^{1,927} - 2 \right] \right\} \right\}, \quad 0,5 \leq W_7 \leq 10,0.$
< 0,5	1,0	
> 10,0	0,001	
$W_8 - \text{conținutul de alcool metilic, g/dm}^3$		
W_8	h_8	$h_8 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{1,1 - W_8}{1,1} \right)^{0,557} - 2 \right] \right\} \right\}, \quad 0 < W_8 \leq 1,1.$
0	1,0	
1,0	0,5	

MD 2084 C2 2003.01.31

10

$> 1,1$	$0,001$		
<i>W₉ – conținutul de radionuclizi Ce¹³⁷, Bk/L</i>			
W_9	h_9	$h_9 = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{72 - W_9}{22} \right)^{0,557} - 2 \right] \right\} \right\}, \quad 50 \leq W_9 \leq 72.$	
< 50	$1,0$		
70	$0,5$		
> 72	$0,001$		
<i>W₁₀ – conținutul de radionuclizi Sr⁹⁰, Bk/L</i>			
W_{10}	h_{10}	$h_{10} = \exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{105 - W_{10}}{55} \right)^{0,557} - 2 \right] \right\} \right\}, \quad 50 \leq W_{10} \leq 105.$	
< 50	$1,0$		
100	$0,5$		
> 105	$0,001$		

Se calculează valoarea indicelui generalizat al calității conform metodei revendicate. Se determină criteriile speciale conform formulelor prezentate în tabelul 3 pentru:

- alcoolul etilic $d_1 = 0,999$;
- zahăr $d_2 = 0,993$;
- densitatea optică $d_3 = 0,999$;
- vârstă $d_4 = 0,990$;
- extractul redus $d_5 = 0,998$;
- substanțele tanante $d_6 = 0,997$;
- lignină $d_7 = 0,999$;
- vanilină $d_8 = 0,925$;
- componente ale “eterului enantic” $d_9 = 0,998$;
- gradul de oxidare a substanțelor tanante $d_{10} = 0,157$;
- alcoolul β-feniletilic $g_1 = 0,979$;
- raportul între substanțele tanante și lignină $g_2 = 0,999$;
- raportul între hidroxili pirogalici și substanțele tanante $g_3 = 0,999$;
- fier $h_1 = 1,0$;
- cupru $h_2 = 1,0$;
- plumb $h_3 = 1,0$;
- cadmiu $h_4 = 1,0$;
- arsen $h_5 = 1,0$;
- mercur $h_6 = 1,0$;
- zinc $h_7 = 1,0$;
- alcool metilic $h_8 = 0,998$;
- radionuclizi de Ce¹³⁷ $h_9 = 1,0$;
- radionuclizi de Sr⁹⁰ $h_{10} = 1,0$.

Se calculează indicele compozиiei fizico-chimice a divinului – $D_1 = 0,867$.

Se calculează indicele calității:

$$D_2 = 0,2 + 0,8 \cdot \left(\exp \left\{ -\exp \left\{ -\left[9 \left(\frac{8,43 - 8,3}{0,3} \right)^{0,860} - 2 \right] \right\} \right\} \right) = 0,930.$$

Se calculează indicele tipicității divinului – $D_3 = 0,992$.

Se calculează indicele compozиiei fizico-chimice a divinului după conținutul impurităților toxice $D_4 = 1,0$.

Acești indici se combină într-un indice generalizat al calității divinului:

$$D = \sqrt[4]{0,867 \cdot 0,930 \cdot 0,992 \cdot 1,0} = 0,946.$$

Divinul a fost evaluat conform metodei cunoscute [1] prin degustare cu 8,43 puncte, ceea ce la transformare în indicele D_2 a constituit 0,930, adică organoleptic proba corespunde notei estimative “calitate foarte bună”. Indicele compozиiei fizico-chimice D_1 s-a evaluat cu 0,867 puncte, ceea ce corespunde “calității foarte bune”. Indicele tipicității divinului D_3 cu 0,992 puncte corespunde “calității foarte bune”. Indicele compozиiei fizico-chimice a divinului după conținutul de impurități toxice D_4 s-a estimat cu 1,0 puncte și de asemenea corespunde “calității foarte bune”. Indicele generalizat al calității D al probei a constituit 0,946, aceasta corespondând cu nota “calitate foarte bună” (tab. 1).

40 Pentru comparare cu metoda cunoscută [1] indicele generalizat al calității D a fost transformat în punctajul estimativ din metoda cunoscută [1] prin formula:

MD 2084 C2 2003.01.31

11

$$Y^* = 8,3 + 0,3 \cdot \frac{\ln \left(\frac{1}{\ln \left(\frac{1}{\frac{0,939 - 0,2}{0,8}} \right)} + 2 \right)}{9} = 8,44.$$

Punctajul estimativ de calitate al probei calculat prin metoda menționată egal cu 8,44 s-a dovedit a fi cu 0,01 puncte mai înalt decât nota organoleptică conform metodei cunoscute [1], fapt care se explică prin compoziția fizico-chimică și tipicitatea optime și prin lipsa sau concentrația minimă de elemente și compuși toxici.

5 *Exemplul 2.* Pentru determinarea indicelui generalizat al calității conform metodei revendicate și conform metodei cunoscute [1] s-a selectat divinul "Barza Albă" de vârstă 4,5...5 ani fabricat la FVCT

Tabelul 4
Compoziția fizico-chimică și calitatea divinului "Barza Albă"

Denumirea indicelui	Metoda cunoscută	Metoda revendicată
1	2	3
Fracția volumetrică de alcool etilic, % vol.	40,0	40,0
Conținutul de zahăr, g/dm ³	14,8	14,8
Densitatea optică, E ⁰	0,45	0,45
Vârstă, ani	4,47	4,47
Concentrația masică a extractului redus, g/dm ³	1,6	1,6
Concentrația masică a substanțelor tanante, g/dm ³	0,27	0,27
Concentrația masică a ligninei, g/dm ³	0,26	0,26
Concentrația masică a vanilinelor, g/dm ³	2,1	2,1
Concentrația masică a componentelor principale ale "eterului enantic", mg/dm ³	–	18,0
Concentrația masică a hidroxililor pirogalici, mg/dm ³	–	41
Gradul de oxidare a substanțelor tanante, g/dm ³	–	15,1
Concentrația masică a fierului, mg/dm ³	0,3	0,3
Concentrația masică a cuprului, mg/dm ³	2,2	2,2
Fracția masică de plumb, mg/kg	0	0
Fracția masică de cadmiu, mg/kg	0	0
Fracția masică de arsen, mg/kg	0	0
Fracția masică de mercur, mg/kg	0	0
Fracția masică de zinc, mg/kg	0,38	0,38
Concentrația masică a alcoolului metilic, g/dm ³	0,95	0,95
Concentrația masică de radionuclizi de Ce ¹³⁷ , Bk/L	–	0
Concentrația masică de radionuclizi de Sr ⁹⁰ , Bk/L	–	0
Concentrația masică a alcoolului β-feniletilic, mg/dm ³	–	2,0
Raportul c.mas. a substanțelor tanante la c.mas. a ligninei	–	1,04
Raportul c.mas. a hidroxililor pirogalici la c.mas. a substanțelor tanante	–	0,151

MD 2084 C2 2003.01.31

12

Aprecierea organoleptică, puncte *)	8,46	8,46
Indicele fizico-chimic al compozitiei divinului D_1	–	0,849
Indicele calitatii divinului D_2	–	0,930
Indicele tipicitatii divinului D_3	–	0,056
Indicele toxicitatii D_4	–	0,963
Indicele generalizat al calitatii $D = \sqrt{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4}$	–	0,459
Indicele generalizat al calitatii exprimat în puncte	–	8,35

Notă: pentru divinurile de vîrstă 4,5...5 ani evaluarea organoleptică conform metodei cunoscute [1] oscilează în limitele a 8,3...8,6 puncte.

Se calculează valoarea indicelui generalizat al calitatii conform metodei revendicate. Se determină criteriile speciale conform formulelor prezentate în tabelul 3 pentru:

- 5 - alcoolul etilic $d_1 = 0,999$;
 - zahăr $d_2 = 0,999$;
 - densitatea optică $d_3 = 0,997$;
 - vîrstă $d_4 = 0,971$;
 - extractul redus $d_5 = 0,910$;
 10 - substanțele tanante $d_6 = 0,996$;
 - lignină $d_7 = 1,0$;
 - vanilină $d_8 = 0,872$;
 - componente de bază ale “eterului enanic” $d_9 = 0,991$;
 - gradul de oxidare a substanțelor tanante $d_{10} = 0,145$;
 15 - alcoolul β-feniletilic $g_1 = 0,999$;
 - raportul între substanțele tanante și lignină $g_2 = 0,001$;
 - raportul între hidroxili pirogalici și substanțele tanante $g_3 = 1,0$;
 - fier $h_1 = 1,0$;
 - cupru $h_2 = 1,0$;
 20 - plumb $h_3 = 1,0$;
 - cadmiu $h_4 = 1,0$;
 - arsen $h_5 = 1,0$;
 - mercur $h_6 = 1,0$;
 - zinc $h_7 = 1,0$;
 25 - alcool metilic $h_8 = 0,684$;
 - radionuclizi de Ce¹³⁷ $h_9 = 1,0$;
 - radionuclizi de Sr⁹⁰ $h_{10} = 1,0$.

Se calculează indicele compozitiei fizico-chimice a divinului – $D_1 = 0,849$.

Se calculează indicele calitatii:

$$30 \quad D_2 = 0,2 + 0,8 \cdot \left(\exp \left\{ - \exp \left\{ - \left[9 \left(\frac{8,46 - 8,3}{0,3} \right)^{0,860} - 2 \right] \right\} \right\} \right) = 0,969 .$$

Se calculează indicele tipicitatii divinului – $D_3 = 0,056$.

Se calculează indicele compozitiei fizico-chimice a divinului după conținutul de impurități toxice $D_4 = 0,963$.

Acești indici se combină într-un indice generalizat al calitatii divinului:

$$D = \sqrt[4]{0,849 \cdot 0,969 \cdot 0,056 \cdot 0,963} = 0,459 .$$

- 35 Divinul a fost evaluat prin metoda cunoscută [1] cu ajutorul degustării cu 8,46 puncte, ceea ce la transformarea în indicele D_2 a constituit 0,969, adică organoleptic proba de divin corespunde notei “calitate foarte bună”. Indicele compozitiei fizico-chimice D_1 s-a evaluat cu 0,849 puncte, ceea ce corespunde “calitatii foarte bune”. Indicele tipicitatii divinului D_3 a obținut 0,056 puncte, ceea ce corespunde “calitatii foarte proaste”. Indicele compozitiei fizico-chimice a divinului după conținutul de impurități toxice D_4 s-a estimat cu 0,963 puncte, ceea ce corespunde “calitatii foarte bune”. Indicele generalizat al calitatii D al probei a constituit 0,459, aceasta corespondând cu nota “calitate satisfăcătoare” (tab. 1).
- 40 Pentru comparare cu metoda cunoscută [1] indicele generalizat al calitatii D a fost transformat în punctajul estimativ din metoda cunoscută [1] prin formula:

MD 2084 C2 2003.01.31

13

$$Y^* = 8,3 + 0,3 \cdot \ln \left(\frac{1}{\ln \left(\frac{1}{\frac{0,459 - 0,2}{0,8}} \right)} \right) + 2 = 8,35.$$

Punctajul estimativ de calitate al probei calculat prin metoda menționată egal cu 8,35 s-a dovedit a fi cu 0,11 puncte mai jos decât nota organoleptică conform metodei cunoscute [1], fapt care se explică prin devierea indicilor de tipicitate, ceea ce s-a reflectat asupra indicelui generalizat al calității.

5

(57) Revendicare:

Metodă de evaluare a calității divinurilor care include analiza cantitativă și organoleptică a compozиiei lor cu determinarea alcoolului etilic, zaharurilor, densității optice, extractului sec nereducător, substanțelor tanante, ligninei, vanilinei, compușilor și elementelor toxice: alcoolului metilic, fierului, cuprului, plumbului, cadmiului, arsenului, mercurului, zincului, conținutului etilcaprilatului, etilcaprinatului, etillaурinatului, gradului de oxidare a substanțelor tanante, evaluarea organoleptică a calității în puncte și determinarea calității divinurilor conform calcului indicelui generalizat al calității D ($0 < D \leq 1$), caracterizată prin aceea că gradul de oxidare a substanțelor tanante se determină prin prezența hidroxililor pirogalici, suplimentar se determină conținutul alcoolului β -feniletilic, radionucliziilor de cesiu Cs^{137} , radionucliziilor de strонтиу Sr^{90} și rapoartele componentelor: substanțe tanante față de lignină, hidroxili pirogalici față de substanțe tanante, iar indicele generalizat al calității D ($0 < D \leq 1$) se calculează conform formulei: $D = \sqrt[4]{D_1 \times D_2 \times D_3 \times D_4}$, în care

D_1 - indicele compozиiei fizico-chimice a divinurilor ($0 < D_1 \leq 1$),

D_2 - indicele calității ($0,2 < D_2 \leq 1$),

D_3 - indicele de tipicitate a divinurilor ($0 < D_3 \leq 1$),

D_4 - indicele compozиiei fizico-chimice a divinului după conținutul impurităților toxice ($0 < D_4 \leq 1$), și în funcție de valorile indicelui D se constată calitatea divinului:

0...0,199	- foarte proastă
0,200...0,369	- proastă
0,370...0,629	- satisfăcătoare
0,630...0,799	- bună
0,800...1,000	- foarte bună.

20

25

20

25

(56) Referințe bibliografice:

1. SU 1311410 A
2. Harrington E.C. The desirability function. Industrial quality control. 1965, 21, №10
3. RG 67-02934365-01-96 Reguli Principale de fabricare a DIVIN, aprobat MAșiA al RM 1996.08.23
4. MD 1600 G2 2001.01.31

Şef Secție:

CEBAN Aurelia

Examinator:

NADIOJCHINA Natalia

Redactor:

ANDRIUȚĂ Victoria