



MD 2501 F1 2004.07.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) **2501** ⁽¹³⁾ **F1**
(51) Int. Cl.⁷: C 12 N 1/20

(12) **BREVET DE INVENȚIE**

Hotărârea de acordare a brevetului de invenție poate fi revocată în termen de 6 luni de la data publicării	
<p>(21) Nr. depozit: a 2004 0017 (22) Data depozit: 2004.01.15</p>	<p>(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2004.07.31, BOPI nr. 7/2004</p>
<p>(71) Solicitanți: RUDIC Valeriu, MD; PRODIUS Valeriu, MD (72) Inventatori: RUDIC Valeriu, MD; PRODIUS Valeriu, MD; CIUMAC Daniela, MD; PRODIUS Tatiana, MD; GHELBET Viorica, MD (73) Titulari: RUDIC Valeriu, MD; PRODIUS Valeriu, MD</p>	

(54) **Procedeu de obținere a biomasei de *Spirulina platensis***

(57) **Rezumat:**

Invenția se referă la biotehnologie, în special la procedeele de obținere a biomasei de *Spirulina platensis*, îmbogățită cu peptide, aminoacizi, proteine, ficobiliproteine, polizaharide și lipide, utilizate în industria farmaceutică, alimentară și cosmetică.

Procedeu solicitat constă în cultivarea spirulinei pe mediul nutritiv Gromov nr. 16 în regim de acumulare, cu agitare periodică, la temperatura de 35±2°C și iluminarea permanentă de 12...15 mii

erg/cm²·s în primele 24 de ore de cultivare și de 18...21 mii erg/cm²·s în următoarele 96 de ore. În prima zi de cultivare, după inocularea *Spirulina platensis*, la mediu se adaugă vin roșu sau alb în cantitate de 1...2 mL/L.

Rezultatul invenției constă în sporirea conținutului de aminoacizi, proteine, peptide, ficobiliproteine, polizaharide și lipide în biomasa de *Spirulina platensis*.

Revendicări: 1

MD 2501 F1

MD 2501 F1 2004.07.31

3

Descriere:

Invenția se referă la biotehnologie, în special la procedeele de obținere a biomasei de *Spirulina platensis* îmbogățită cu proteine, peptide, aminoacizi, ficobiliproteine, lipide și polizaharide, utilizate în industria farmaceutică, alimentară și cosmetică.

5 Este cunoscut procedeul de ameliorare a calității biomasei de spirulină, în care se utilizează ca stimulatori diverși compuși ai metalelor [1]. Dezavantajul acestui procedeu constă în aceea că el nu permite sporirea productivității biomasei având componența biochimică satisfăcătoare.

10 Mai este cunoscut procedeul de cultivare a spirulinei în care pentru ameliorarea calității biomasei se utilizează compusul coordinativ trans-[cloraminobis-(dioximato)cobalt III] [2]. Acest procedeu include cultivarea spirulinei pe mediul nutritiv mineral Gromov nr. 16 în regim de acumulare, la iluminarea permanentă de 12...15 mii erg/cm²·s în prima zi de cultivare și de 18...21 mii erg/cm²·s în următoarele zile, la temperatura de 35±2°C cu agitare periodică, în prezența [CoCl(DH)₂NH₃] în concentrație de 5,0...10,0 mg/L.

15 Compusul coordinativ testat asigură o sporire înaltă, în special, a productivității și a conținutului de ciancobalamină, însă nu este posibilă obținerea unei biomase de spirulină cu un conținut sporit al celorlalte principii bioactive.

Problema pe care o rezolvă invenția propusă constă în elaborarea unui procedeu de ameliorare a calității biomasei de spirulină, care asigură sporirea conținutului de aminoacizi, peptide, proteine, ficobiliproteine, polizaharide și lipide în biomasa spirulinei.

20 Esența invenției constă în aceea că procedeul de obținere a biomasei de *Spirulina platensis* include cultivarea spirulinei pe mediul nutritiv Gromov nr. 16 în regim de acumulare, la iluminarea permanentă de 12...15 mii erg/cm²·s în primele 24 ore de cultivare și de 18...21 mii erg/cm²·s în următoarele 96 ore, la temperatura de 35±2°C cu agitare periodică în prezența adaosului de ameliorare. În calitate de adaos de ameliorare a calității biomasei este utilizat vinul roșu sau alb, care se adaugă la mediu în prima zi de cultivare, după inocularea spirulinei, în cantitate de 1...2 mL/L.

Rezultatul în comparație cu cea mai apropiată soluție constă în:

- asigurarea unei majorări a productivității spirulinei de 1,02...1,07 ori;
- sporirea conținutului de aminoacizi în biomasă de 1,94...2,17 ori;
- sporirea conținutului de proteine în biomasă de 1,18...1,34 ori;
- 30 - sporirea conținutului de peptide în biomasă de 1,45...1,99 ori;
- sporirea conținutului de ficobiliproteine în biomasă de 1,58...1,59 ori;
- sporirea conținutului de polizaharide în biomasă de 1,85...1,86 ori;
- sporirea conținutului de lipide în biomasă de 1,79...1,81 ori.

35 Au fost realizate investigații în vederea determinării acțiunii alcoolului etilic (1...2 mL/L soluție de 10%, echivalentul conținutului de etanol în vinuri) asupra productivității și componenței biochimice a biomasei de *Spirulina platensis*. Investigațiile au demonstrat că rezultatul obținut se datorează nu conținutului de alcool din vin, dar faptului că vinul (roșu sau alb) conține microelemente, aminoacizi și alte principii bioactive, care intensifică activitatea enzimelor ce participă la biosinteza proteinelor, polizaharidelor, ficobiliproteinelor și lipidelor, ceea ce duce la sporirea conținutului de aminoacizi și peptide.

40 *Exemple de realizare a invenției*

MD 2501 F1 2004.07.31

5

	cultivare						
Conform celei mai apropiate soluții	[CoCl(DH) ₂ NH ₃]	10	9,73±0,19	0,85±0,03	102,67±0,70	18,05±0,12	2,89±2,0
Conform soluției propuse	Vin roșu	1,0	14,91±0,11	0,80±0,01	86,61±0,09	20,10±0,49	2,67±0,11
		1,5	15,42±0,08	0,83±0,02	102,70±1,02	19,24±0,05	2,88±0,09
		2,0	14,57±0,01	0,72±0,01	99,51±0,54	14,97±0,08	2,80±0,09
	Vin alb	1,0	15,40±0,08	0,68±0,01	101,58±0,07	15,25±0,24	2,71±0,01
		1,5	15,45±0,03	0,81±0,01	103,55±0,02	14,79±0,11	2,72±0,07
		2,0	14,41±0,07	0,75±0,01	89,50±0,12	14,50±0,10	2,59±0,02

MD 2501 F1 2004.07.31

6

(57) Revendicare:

5 Procedeu de obținere a biomasei de *Spirulina platensis*, care include cultivarea spirulinei pe mediul nutritiv Gromov nr.16 cu adaos de ameliorare, în regim de acumulare, la iluminarea permanentă de 12...15 mii erg/cm²-s în primele 24 ore de cultivare și de 18...21 mii erg/cm²-s în următoarele 96 ore, la temperatura de 35±2°C cu agitare periodică, **caracterizat prin aceea că** în calitate de adaos de ameliorare se utilizează vin roșu sau alb, care se adaugă la mediu în prima zi de cultivare, după inocularea spirulinei, în cantitate de 1...2 mL/L.

10

(56) Referințe bibliografice:

1. Рудик В.Ф., Бульмага В.П., Кириак Т.В., Чапурина Л.Ф. Продуктивность и биохимический состав *Spirulina platensis* (NORDST.) Geitl. CALU-835 при культивировании в присутствии координационных соединений Zn (II). Альгология, том 13, №3, 2003, p. 322-329
2. SU 1697425 A1

Șef Secție:

GUȘAN Ala

Examinator:

BAZARENCO Tatiana

Redactor:

LOZOVANU Maria