



MD 2808 F1 2005.07.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) 2808₍₁₃₎ F1
(51) Int. Cl.⁷: A 01 G 17/02;
C 05 F 5/00

(12) BREVET DE INVENȚIE

Hotărârea de acordare a brevetului de invenție poate fi revocată în termen de 6 luni de la data publicării	
(21) Nr. depozit: a 2004 0247 (22) Data depozit: 2004.10.06	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2005.07.31, BOPI nr. 7/2005
(71) Solicitant: INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A REPUBLICII MOLDOVA, MD	
(72) Inventatori: TUDORACHE Gheorghe, MD; POPOVICI Ana, MD; TOMA Simion, MD; EREZANU Nina, MD; PERJU Lilia, MD	
(73) Titular: INSTITUTUL DE FIZIOLOGIE A PLANTELOR AL ACADEMIEI DE ȘTIINȚE A REPUBLICII MOLDOVA, MD	

(54) Remediul de fertilizare extraradiciculară a viței de vie

(57) Rezumat:

1
Invenția se referă la agricultură, în particular la viticultură și poate fi aplicată pentru fertilizarea extraradiciculară a viței de vie.

Remediul de fertilizare extraradiciculară a viței de vie, conform invenției, conține drojdie de vin concentrată cu un conținut de substanțe uscate de

5 2
5 25% și apă, ingredientele fiind luate în următorul raport, % de volum: drojdie de vin concentrată 5...15, apă restul.

Rezultatul constă în optimizarea procesului de creștere a viței de vie.

Revendicări: 1

10

MD 2808 F1 2005.07.31

Descriere:

Invenția se referă la agricultură, în particular la viticultură și poate fi folosită pentru fertilizarea extraradiculară a viței de vie.

Vița de vie pune în valoare terenurile cu o fertilitate scăzută, folosirea cărora pentru alte culturi este mai puțin rentabilă, fapt ce contribuie la utilizarea rațională a pământului și obținerea unor profituri substanțiale. Pe aceste soluri, însă, există necesitatea necondiționată de ameliorare a nivelului de nutriție a plantelor. Îngrășăminte minerale tradiționale la etapa actuală sunt foarte costisitoare, ele fiind și o sursă de poluare a mediului înconjurător. Din aceste considerente, în prezent, se caută surse noi, netraditionale de fertilizare a plantelor. În acest scop binevenite sunt diferite deșeuri agroindustriale, în special ale complexului vitivinicol.

Este cunoscut amestecul de macro- și microelemente pentru fertilizarea plantelor de cultură în următoarea componență:

superfosfat – 6%, silitră amoniacală – 0,3%, clorură de potasiu – 0,2%, molibdat de amoniu – 0,1%, clorură de zinc – 0,02% și iodură de potasiu – 0,01% [1]. Dezavantajul acestui remediu ține de prețul majorat al constituentelor și de riscul ecologic.

Cea mai apropiată soluție este procedeul de fertilizare extraradiculară a viței de vie, care constă în tratarea foliară a plantelor cu remediu ce conține 10...20% volum de borhot de vin și apă [2]. Dezavantajul acestui remediu constă în eficacitatea redusă.

Problema pe care o rezolvă invenția constă în sporirea gradului de manifestare a potențialului productiv.

Remediul de fertilizare extraradiculară a viței de vie, conform invenției, conține drojdie de vin concentrată cu un conținut de substanțe uscate de 25% și apă, ingredientele fiind luate în următorul raport, % de volum: drojdie de vin concentrată 5...15, apă restul.

Drojdia de vin utilizată conține circa 25% de substanțe uscate (105°C), inclusiv 5...8% de substanțe minerale. Componenții de bază ai substanțelor minerale sunt: K, P, Ca, Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, V, Ni, Mo și.a. Se conțin cantități impunătoare de hidrați de carbon, substanțe proteice, grăsimi, aminoacizi, inclusiv și cei indispensabili.

Rezultatul invenției constă în optimizarea proceselor de creștere și dezvoltare a plantelor de viță de vie.

Exemplu de realizare a invenției

Plantele a două soiuri de viță de vie Alb de Suruceni și Cabernet-Sauvignon au fost tratate extraradicular cu suspensie apoasă de drojdie de vin (Foliarplus), în concentrația de 5, 10 și 15% volum de drojdie de vin în apă, cu 5 zile până la înflorire și la 15 zile după faza de înflorire. Conform celei mai apropiate soluții, plantele au fost tratate cu suspensie apoasă de borhot de vin de 20% volum. Plantele din varianta martor au fost stropite cu apă.

Rezultatele obținute indică concludent că remediul propus exercită un efect pozitiv asupra creșterii și dezvoltării viței de vie, gradul de acțiune în funcție de concentrația preparatului și particularitățile biologice ale soiurilor studiate.

Optimizarea proceselor de creștere și dezvoltare a viței de vie

Soiul	Varianta	Lungimea medie a lăstarilor anuali, cm $M \pm m$	Suprafața foliară a 100 frunze, dm^2	Conținutul pigmentilor fotosintizei, mg/dm^2		
				Clorofile		Carotenoide
				a	b	
Alb de Suruceni	Martor	138,3 \pm 1,3	76,14	1,974	0,803	1,003
	Foliarplus 5%	157,7 \pm 1,7	87,35	2,056	0,816	1,019
	Foliarplus 10%	158,3 \pm 0,8	90,78	2,214	0,876	1,104
	Foliarplus 15%	177,0 \pm 2,1	92,26	2,372	0,868	1,121
	Borhot de vin 20%	151,3 \pm 1,4	82,92	2,185	0,854	1,079
Cabernet - Sauvignon	Martor	116,7 \pm 0,7	60,94	2,086	0,837	1,114
	Foliarplus 5%	120,3 \pm 1,2	71,97	2,073	0,872	1,113
	Foliarplus 10%	129,7 \pm 0,9	74,76	2,219	0,861	1,173
	Foliarplus 15%	131,0 \pm 1,5	79,18	2,466	0,911	1,217
	Borhot de vin 20%	119,6 \pm 1,1	70,12	2,203	0,884	1,138

S-a constatat că fertilizarea extraradiculară a viței de vie cu remediul propus induce sporirea lungimii medii a lăstarilor anuali la soiul Cabernet-Sauvignon cu 14,3 cm, iar la soiul Alb de

MD 2808 F1 2005.07.31

4

Suruceni cu 38,7 cm față de martor, efectul pozitiv fiind mai superior la soiul de masă în comparație cu cel tehnic.

Acțiunea fiziologică a constituentelor remediuului propus a contribuit considerabil la majorarea suprafetei foliare la ambele soiuri aflate în studiu. Cel mai pronunțat efect a fost evidențiat la plantele soiului Cabernet-Sauvignon tratate cu soluție apoasă de 15%; s-a constatat o sporire cu $18,24 \text{ dm}^2$ în comparație cu martorul și cu $9,06 \text{ dm}^2$ față de cea mai apropiată soluție.

La plantele tratate au fost scoase în evidență modificări semnificative în conținutul pigmentilor fotosintezei. Sporirea conținutului clorofilelor *a* și *b*, îndeosebi a carotenoidelor, a condus la intensificarea procesului de fotosinteză și a celor de acumulare a substanțelor plastice, fapt ce a condiționat sporirea vigorii de creștere a lăstariilor anuali și majorarea suprafetei foliare.

Astfel, rezultatele obținute privind acțiunea fiziologică a preparatului Foliarplus asupra viței de vie indică concluzia că acest preparat poate fi utilizat în calitate de remediu de nutriție extraradiculară suplimentară, iar folosirea drojdiei de vin în acest scop conturează importanța social-economică exprimată prin reducerea poluării apelor cu acest reziduu, crearea unui ciclu de producere închis ecologic în complexul viti-vinicul și obținerea unui efect economic evident.

(57) Revendicare:

Remediu de fertilizare extraradiculară a viței de vie care conține produs vinicol secundar și apă, caracterizat prin aceea că în calitate de produs vinicol secundar se utilizează drojdia de vin concentrată cu un conținut de substanțe uscate de 25%, ingredientele fiind luate în următorul raport, % de volum:

drojdie de vin concentrată 5...15
apă restul.

(56) Referințe bibliografice:

1. Агроуказания по виноградарству. Кишинев, 1989, 359 p.
2. RU 2058972 C1 1996.04.27

Director Departament:

CRECETOV Veaceslav

Examinator:

GUŞAN Ala

Redactor:

CANȚER Svetlana