

Metodă chirurgicală de tratament al tumorilor craniofaciale care constă în aceea că opțional se ligaturează artera carotidă externă pe partea afectată pentru prevenirea hemoragiei, se efectuează prelucrarea câmpului operator ce include regiunea frontală, regiunea temporoorbitală, regiunea laterală a feței de partea localizării tumorii, nasul, buza superioară, mucoasa nazală și bucală, apoi se efectuează o incizie de la buza superioară în sus pe baza suprafeței laterale a nasului până la unghiul medial al ochiului și, în dependență de răspândirea tumorii, se prelungește pe sprânceană sau pe mijlocul frunții pe regiunile frontală și temporală, după care se pregătește un lambou cutanat deepidermizat, care include și periostul detașat din regiunea supraorbitală sau din regiunile frontală și temporală; apoi conținutul orbitei se deplasează în jos și lateral și se descoperă bolta orbitei, peretele lateral al osului etmoidal, peretele anterior al sinusului maxilar până la fasciculul vasculonervos infraorbital, apoi se înlătură tumoarea prin rezecția plăcii orbitale cu celulele afectate ale osului etmoidal, lamelele afectate ale peretelui cavității nazale și ale peretelui superior al orbitei în caz de necesitate, apoi se efectuează o tamponadă a cavității formate cu o meșă cu unguent, a cărei capăt se scoate prin orificiul nazal; se suturează ermetic dura mater, se efectuează plastia defectului bazei craniului prin suturarea lamboului pregătit de dura mater și de periostul orbitei, după care pielea pe față se suturează cu suturi atraumatice, iar restul plăgii cu suturi cu fire separate.