



MD 3445 F1 2007.12.31

REPUBLICA MOLDOVA



**(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală**

(11) 3445 (13) F1

**(51) Int. Cl.: A61B 17/00 (2006.01)
A61L 24/04 (2006.01)
A61K 35/16 (2006.01)
A61K 36/02 (2006.01)**

(12) BREVET DE INVENȚIE

Hotărârea de acordare a brevetului de invenție poate fi revocată în termen de 6 luni de la data publicării	
(21) Nr. depozit: a 2007 0244 (22) Data depozit: 2007.09.07	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2007.12.31, BOPI nr. 12/2007
(71) Solicitanți: ABABII Ion, MD; SANDUL Alexandru, MD; RUDIC Valeriu, MD; GĂINĂ Stela, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; SANDUL Ghenadie, MD	
(72) Inventatori: ABABII Ion, MD; SANDUL Alexandru, MD; RUDIC Valeriu, MD; GĂINĂ Stela, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; SANDUL Ghenadie, MD	
(73) Titulari: ABABII Ion, MD; SANDUL Alexandru, MD; RUDIC Valeriu, MD; GĂINĂ Stela, MD; ANGHELICI Gheorghe, MD; SANDUL Ghenadie, MD	

(54) Metodă de tratament al amigdalitei cronice decompensate

(57) Rezumat:

MD 3445 F1 2007.12.31

1
Invenția se referă la medicină, în special la otorinolaringologie și poate fi aplicată pentru tratamentul pacienților cu amigdalită cronică decompenSATă.

Esența invenției constă în aceea că se efectuează anestezia locală cu soluție de 1% de lidocaină și o premedicație intravenoasă cu soluție de atropină, apaurină și omnopon, apoi se înlătură amigdalele palatine prin decolare extracapsulară, iar polul inferior al amigdalelor se rezecă cu o ansă rece. După înlăturare se efectuează hemostază cu un adeziv fibrinic, care constă din soluție de fibrinogen, aprotinină, trombină și clorură de calciu

2
în soluție de 0,9% de NaCl în următorul raport al componentelor, la 1 ml:
5 fibrinogen (mg) 15...30
aprotinină (UIK) 250...1000
trombină (UA) 25...100
clorură de calciu (µmol) 15...30,
iar în perioada postoperatorie, după 8 ore, plaga se irigă cu soluție de BioR 0,5%, câte 0,3...0,5 ml
10 peste fiecare 8 ore timp de 7 zile.
Revendicări: 1

MD 3445 F1 2007.12.31

3

Descriere:

Invenția se referă la medicină, în special la otorinolaringologie și poate fi aplicată pentru tratamentul pacienților cu amigdalită cronică decompensată.

Este cunoscută metoda de tratament al amigdalitei cronice decompensate care constă în aceea că se efectuează anestezie locală prin infiltrație cu sol. de lidocaină 1% - 3 ml și o premedicație intravenoasă (sol. de atropină, omnopon), apoi se înlătură amigdalele palatine prin decolare extracapsulară, iar polul inferior se rezecă cu o ansă rece. După înlăturarea țesutului limfoid cronic inflamat se efectuează hemostaza prin utilizarea electrocoagulatorului. În perioada intraoperatorie și postoperatorie se administrează preparate antibiotic și analgezice [1].

Dezavantajele metodei cunoscute constau în faptul că în perioada postoperatorie în regiunea necrozei de coagulare se determină dureri intense timp îndelungat. Aceasta se explică prin utilizarea electrocoagulării, în special în polul inferior, unde se determină o mare abundență a vaselor sanguine, precum și a terminațiunilor nervoase, care determină sindromul algic. Regenerarea plăgii după utilizarea electrocoagulatorului este deficentă, îndelungată și necesită administrarea medicației analgezice puternice.

Problema pe care o rezolvă invenția constă în elaborarea unei metode de tratare a pacienților cu amigdalită cronică decompensată prin efectuarea intervenției chirurgicale cu asigurarea unei hemostaze complete intraoperatorii, evoluția postoperatorie cu sindrom algic cât mai puțin pronunțat și ameliorarea regenerării lojelor posttonsilectomice.

Eseuța invenției constă în aceea că se efectuează anestezia locală cu soluție de 1% de lidocaină și o premedicație intravenoasă cu soluție de atropină, apaurină și omnopon, apoi se înlătură amigdalele palatine prin decolare extracapsulară, iar polul inferior al amigdalelor se rezecă cu o ansă rece. După înlătura se efectuează hemostază cu un adeziv fibrinic, care constă din soluție de fibrinogen, aprotinină, trombină și clorură de calciu în soluție de 0,9% de NaCl în următorul raport al componentelor, la 1 ml:

fibrinogen (mg)	15...30
aprotinină (UIK)	250...1000
trombină (UA)	25...100
clorură de calciu (μmol)	15...30,

iar în perioada postoperatorie, după 8 ore, plaga se irigă cu soluție de BioR 0,5%, câte 0,3...0,5 ml peste fiecare 8 ore timp de 7 zile.

Rezultatul invenției constă efectuarea intervenției chirurgicale cu asigurarea unei hemostaze definitive intraoperatorii, evoluția postoperatorie cu sindrom algic cât mai puțin pronunțat și ameliorarea regenerării lojelor posttonsilectomice.

Metoda se efectuează în modul următor.

Pacientul a fost internat cu diagnosticul de amigdalită cronică decompensată. Examenul clinic și paraclinic a confirmat diagnosticul. S-a efectuat anestezia locală prin infiltrație cu sol. de lidocaină 1% - 30 ml și o premedicație intravenoasă (sol. atropină, apaurină, omnopon), apoi s-au înlăturat amigdalele palatine prin decolare extracapsulară, s-a rezecat polul inferior al amigdalelor, apoi s-a efectuat hemostaza cu un adeziv fibrinic, care include sol. de fibrinogen, aprotinină, trombină și clorură de Ca^{+2} în sol. NaCl 0,9% în următorul raport al componentelor, la 1 ml:

fibrinogen (mg)	15...30
aprotinină (KIU)	250...1000
trombină (IU)	25...100
clorură de Ca^{+2} (μmol)	15...30,

în perioada postoperatorie, după 8 ore, plaga postoperatorie s-a irigat cu soluție de BioR 0,5% câte 0,3...0,5 ml, peste fiecare 8 ore timp de 7 zile.

Exemplu

45 Pacientul G., a.n. 1975, a fost internat în secția ORL a SCM „Sf. Treime” la 02.05.07 cu diagnosticul amigdalită cronică decompensată, pusee de angină. S-a efectuat amigdalectomia – anestezie locală prin infiltrație cu sol. de lidocaină 1% - 30 ml și premedicație intravenoasă (sol. de Atropină, apaurină, omnopon), decolare extracapsulară, rezecția polului inferior cu o ansă rece și hemostaza mecanică minuțioasă. În lojele amigdaliene se aplică un adeziv fibrinic pregătit preoperator, care include sol. de fibrinogen, aprotinină, trombină și clorură de Ca^{+2} în sol. NaCl 0,9%, iar în perioada postoperatorie, după 8 ore, plaga postoperatorie s-a irigat cu soluție de BioR 0,5% din *Spirulina platensis*, câte 0,5 ml peste fiecare 8 ore timp de 7 zile.

MD 3445 F1 2007.12.31

4

(57) Revendicare:

- Metodă de tratament al amigdalitei cronice decompensate, care constă în aceea că se efectuează anestezia locală cu soluție de 1% de lidocaină și o premedicație intravenoasă cu soluție de atropină, apaurină și omnopon, apoi se înlătură amigdalele palatine prin decolare extracapsulară, iar polul inferior al amigdalelor se rezecă cu o ansă rece, după care se efectuează hemostază cu un adeziv fibrinic, care constă din soluție de fibrinogen, aprotinină, trombină și clorură de calciu în soluție de 0,9% de NaCl în următorul raport al componentelor, la 1 ml:
- | | | |
|----|--------------------------|------------|
| 10 | fibrinogen (mg) | 15...30 |
| | aprotinină (UIK) | 250...1000 |
| | trombină (UA) | 25...100 |
| | clorură de calciu (μmol) | 15...30, |
- iar în perioada postoperatorie, după 8 ore, plaga se irigă cu soluție de BioR 0,5%, câte 0,3...0,5 ml peste fiecare 8 ore timp de 7 zile.

20

(56) Referințe bibliografice:

1. Протасевич Г. Медикаментозне лікування хворих після тонзилектомії. Журнал вушных, носовых и горловых болезней, №1, 2003, с. 69-76

Director Departament:

JOVMIR Tudor

Examinator:

GROSU Petru

Redactor:

LOZOVANU Maria