




MD 3773 G2 2008.12.31

REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) 3773 (13) G2

(51) Int. Cl.: A61K 36/47 (2006.01)

A61K 36/87 (2006.01)

A61K 36/53 (2006.01)

A61K 36/28 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. depozit: a 2008 0148 (22) Data depozit: 2008.05.30	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2008.12.31, BOPI 12/2008
<p>(71) Solicitant: MEREUȚĂ Ion, MD (72) Inventatori: MEREUȚĂ Ion, MD; CARAUȘ Vladimir, MD; HARȘTEA Diana, MD; MUNTEANU-LEU Nadejda, MD (73) Titular: MEREUȚĂ Ion, MD</p>	

(54) Remediul pentru tratamentul afecțiunilor precanceroase ale tegumentelor și mucoaselor

(57) Rezumat:

1

Invenția se referă la medicină, în special la oncologie și farmacologia clinică.

Remediul pentru tratamentul afecțiunilor precanceroase ale tegumentelor și mucoaselor include ulei de ricin, ulei din semințe de struguri, ulei de paciuli și ulei de armurariu în următorul raport al componentelor, in % mas.:

5

10

2

ulei de ricin	25...27
ulei din semințe de struguri	13...16
ulei de paciuli	47...48
ulei de armurariu	restul.
Revendicări: 1	

MD 3773 G2 2008.12.31

3

Descriere:

Invenția se referă la medicină, în special la oncologie și farmacologia clinică.

Este cunoscut remediul Ricinol, cu efect regenerator, antiinflamator și antiedemic, care include ulei de ricin, acizi grași, glicerină, vitamina C, apă [1].

Dezavantajele acestui remediu constau în aceea că are un efect umectant slab pronunțat și nu posedă efect anticancerigen.

Problema pe care o rezolvă invenția constă în extinderea arsenalului de remedii cu efect regenerator, anticancerigen și antiinflamator, utilizate în profilaxia și tratamentul afecțiunilor precanceroase ale tegumentelor și mucoaselor.

Esența invenției constă în aceea că remediul pentru tratamentul afecțiunilor precanceroase ale tegumentelor și mucoaselor include ulei de ricin, ulei din semințe de struguri, ulei de paciuli și ulei de armurariu în următorul raport al componentelor, în % mas.:

ulei de ricin	25...27
ulei din semințe de struguri	13...16
ulei de paciuli	47...48
ulei de armurariu	restul.

Rezultatul constă în extinderea arsenalului de remedii utilizate în profilaxia și tratamentul afecțiunilor precanceroase ale tegumentelor și mucoaselor, care posedă un grad sporit de umectare și un efect anticancerigen.

Rezultatul obținut în tratamentul și profilaxia afecțiunilor precanceroase ale tegumentelor și mucoaselor la utilizarea remediului solicitat se datorează combinației reușite a ingredientelor atât calitative cât și cantitative. Remediul posedă un efect net față de fiecare ingredient în parte. Efectul anticancerigen al remediului se datorează acțiunii asupra proliferării atipice a celulelor, în aşa fel tratând precursorii cancerigeni ai tegumentelor și mucoaselor. Acțiunea anticancerigenă se manifestă numai asupra celulelor cu proliferare necontrolată. Orice deviere a indicilor cantitativi sau calitativi ai remediului nu menține efectul anticancerigen.

Uleiul de ricin, cunoscut în practica medicală ca un remediu cu acțiune laxativă, ușor pătrunde adânc în piele și o umectează intens.

Uleiul din semințe de struguri este un remediu bine cunoscut cu acțiune regeneratoare și citoprotectorie.

Uleiul de paciuli este un remediu care îmbunătățește circulația sanguină și are efect regenerativ, la combinarea cu acizii grași ai uleiului de ricin, și efect antibacterian.

Uleiul de armurariu este cunoscut ca o sursă de acizi grași, care nu se sintetizează în corpul uman, și ca o sursă de vitamina C, posedând efect regenerativ, antiinflamator, antiedemic.

Modul de preparare a remediului revendicat constă în aceea că se amestecă timp de 60 min la temperatură de 45° uleiul de ricin, uleiul din semințe de struguri, uleiul de paciuli, după care se toarnă uleiul de armurariu și din nou se amestecă timp de 30 min la temperatură de 68°, apoi se răcește până la temperatură camerei și se distribuie în recipiente din sticlă întunecată câte 100 ml.

Exemplu concret de preparare a 100 ml de remediu

Se iau 26 ml de ulei de ricin, 13,5 ml de ulei din semințe de struguri, 47,5 ml de ulei de paciuli, se amestecă timp de 60 min la temperatură de 45°, după care se toarnă 13 ml de ulei de armurariu până la 100 ml și din nou se amestecă timp de 30 min la temperatură de 68°, apoi se răcește până la temperatură camerei și se distribuie într-un recipient din sticlă întunecată.

Modul de utilizare constă în aceea că locul necesar afectat de o patologie precanceroasă a pielii se prelucrează cu remediul solicitat de 4...6 ori pe zi. Prelucrarea se efectuează până la dispariția completă a manifestărilor clinice.

Termenul de valabilitate al remediului este de 1 an.

Exemplul 1

Bolnava A., 44 ani, a fost internată în Institutul Oncologic din Chișinău, acuzând papule roze pe sanul drept cu mărimea de 5 mm, acoperite cu scuamă de nuanță surie, puțin infiltrate în piele și ridicate deasupra pielii. S-a stabilit diagnosticul de boala Bower, care a fost confirmat prin biopsie. Aceste erupții au fost prelucrate pe parcursul a 24 zile cu remediul revendicat, după care s-a constatat dispariția lui. Pacienta o dată la 2 luni cu scop profilactic a prelucrat locul menționat de 4...6 ori pe zi timp de 2 săptămâni. Bolnava a fost examinată peste 6 luni, recidive nu s-au constatat.

Exemplul 2

Bolnava X., 47 ani, a fost internată în Institutul Oncologic din Chișinău acuzând papule roze pe spate de formă neregulată, cu semne de hipercheratoză. S-a stabilit cheratoză actinică, care a fost confirmată prin biopsie. Locul dat a fost prelucrat pe parcursul a 38 zile cu remediul revendicat, după care s-a constatat dispariția lui. Bolnava a fost examinată peste 4 luni, recidive nu s-au constatat.

MD 3773 G2 2008.12.31

4

(57) Revendicări:

Remediu pentru tratamentul afecțiunilor precanceroase ale tegumentelor și mucoaselor, care include ulei de ricin, ulei din semințe de struguri, ulei de paciuli și ulei de armurariu în următorul raport al componentelor, in % mas.:

ulei de ricin	25...27
ulei din semințe de struguri	13...16
ulei de paciuli	47...48
ulei de armurariu	restul.

10

15

(56) Referințe bibliografice:

1. Matcovschi C., Procopișin V., Parții B. Ghid farmacoterapeutic, Chișinău, 2006, p. 1287

Şef Secție: GROSU Petru

Examinator: IUSTIN Viorel

Redactor: LOZOVANU Maria