



MD 4197 C1 2013.09.30

REPUBLICA MOLDOVA



**(19) Agenția de Stat
pentru Proprietatea Intelectuală**

(11) 4197 (13) C1

(51) Int.Cl: *A61B 10/00* (2006.01)
A61K 36/06 (2006.01)
A61K 36/738 (2006.01)
A61K 36/68 (2006.01)
A61L 2/10 (2006.01)

(12) BREVET DE INVENTIE

(21) Nr. depozit: a 2012 0091 (22) Data depozit: 2012.10.22	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2013.02.28, BOPI nr. 2/2013
(71) Solicitanți: DANU Maria, MD; PAVLIUC Galina, MD (72) Inventatori: DANU Maria, MD; PAVLIUC Galina, MD (73) Titulari: DANU Maria, MD; PAVLIUC Galina, MD	

(54) Metodă de tratament al ulcerelor trofice

(57) Rezumat:

<p>1 Invenția se referă la medicină, în special la chirurgie și poate fi utilizată pentru tratamentul ulcerelor trofice.</p> <p>Conform invenției, metoda revendicată constă în aceea că ulcerul trofic se prelucrează zilnic cu soluție de peroxid de hidrogen de 3%, apoi se aplică un amestec care conține pulbere din <i>Langermannia gigantea</i>, ulei din <i>Rosae pingue</i> L. și ulei din <i>Plantago major</i> L., în următorul raport al componentelor, în % mas.:</p>	<p>2 pulbere din <i>Langermannia gigantea</i> 60...70 ulei din <i>Rosae pingue</i> L. 10...20 ulei din <i>Plantago major</i> L. restul, totodată uleiurile preventiv se iradiază cu raze ultraviolete cu lungimea de undă de 180 nm timp de 40 min, seria de tratament constituie 45 zile.</p> <p>Revendicări: 1</p>
<p>5</p>	<p>5</p>

(54) Method for treatment of trophic ulcers

(57) Abstract:

1
The invention relates to medicine, in particular to surgery and may be used for the treatment of trophic ulcers.
5
According to the invention, the claimed method consists in that the trophic ulcer is treated daily with 3% hydrogen peroxide solution, then is applied a mixture containing *Langermannia gigantea* powder, *Rosae pingue* L. oil and *Plantago major* L. oil, in the following component ratio, in mass %:
10
15

2
Langermannia gigantea powder 60...70
Rosae pingue L. oil 10...20
Plantago major L. oil the rest,
At the same time the oils are preliminarily irradiated with ultraviolet rays with a wavelength of 180 nm for 40 min, the course of treatment is 45 days.

Claims: 1

(54) Метод лечения трофических язв

(57) Реферат:

1
Изобретение относится к медицине, в частности к хирургии и может быть использовано для лечения трофических язв.
5
Согласно изобретению, заявленный метод состоит в том, что трофическую язву обрабатывают ежедневно 3%-ным раствором перекиси водорода, затем наносят смесь, содержащую порошок *Langermannia gigantea*, масло *Rosae pingue* L. и масло *Plantago major* L., при следующем соотношении компонентов, в масс. %:
10
15

2
порошок *Langermannia gigantea* 60...70
масло *Rosae pingue* L. 10...20
масло *Plantago major* L. остальное, при этом масла предварительно облучают ультрафиолетовыми лучами с длиной волны 180 нм в течение 40 мин, курс лечения составляет 45 дней.

П. формулы: 1

Descriere:

Invenția se referă la medicină, în special la chirurgie și poate fi utilizată pentru tratamentul ulcerelor trofice.

Este cunoscută metoda de tratament al ulcerelor trofice varicoase, care include asanarea ulcerului trofic de microflora patogenă și țesuturile necrotice, inhibarea inflamării sistemică, stimularea creșterii, maturării țesutului conjunctiv și epitelizarea ulcerului trofic. Componentele principale ale terapiei antibacteriene topice sunt pansamentul cu soluții, emulsii și unguente antiseptice care conțin diverse antibiotice, sulfanilamide și alte preparate cu acțiune antibacteriană. După curățarea suprafeței ulcerului trofic se aplică diverse remedii medicamentoase ce stimulează procesele de regenerare și contribuie la o vindecare mai rapidă a ulcerului, de exemplu: unguentul Vișnevski, balsamul Schostakovski, uleiul de cătină albă. De asemenea se utilizează enzime proteolitice ce condiționează liza țesuturilor necrotice și au acțiune antiinflamatoare și antiedemica [1].

Dezavantajul metodei cunoscute este termenul indelungat de vindecare a ulcerului trofic.

Este cunoscută, de asemenea, metoda de tratament local al ulcerului trofic, care constă în aceea că pe suprafața ulcerelor și plăgilor purulente se aplică un remediu care conține următoarele ingrediente: colagenoză, gentamicină sulfurică, polietilenoxid 1500 și glicerină 10,0...10,1 [2].

Dezavantajul acestei metode constă în aceea că se produce o cicatrizare lentă din cauza că activitatea antibacteriană și necrolitică a compoziției sus-menționate nu este suficientă, totodată activitatea fermentilor utilizati în compozite este limitată în timp din cauza că reacția suprafeței plăgii repede devine alcalină sub acțiunea secrețiilor din plagă.

Mai este cunoscută metoda de tratament al ulcerelor trofice, care constă în aceea că se administrează intern metilxantine, venotonice, anticoagulante, hipotonice, vasodilatante, antihistaminice, iar local se utilizează substanțe de purificare (peroxid de hidrogen de 3%, suc de colanhoe) urmată de aplicarea burețiilor din colagen pe suprafața plăgii curățate pe 1...2 zile. Durata tratamentului constituie de la 2 până la 4 luni [3].

Dezavantajul metodei menționate constă în aceea că nu este destul de eficientă, deoarece la o parte din bolnavii tratați conform metodei date n-au fost înregistrate efecte de curățare pronunțată, iar la 2 pacienți cu ulcere varicoase boala s-a agravat, manifestându-se prin intensificarea durerilor în regiunea ulcerelor cu mărirea lor în volum.

Problema pe care o rezolvă invenția este reducerea termenului de tratament și sporirea efectului curativ.

Conform invenției, metoda revendicată constă în aceea că ulcerul trofic se prelucrează zilnic cu soluție de peroxid de hidrogen de 3%, apoi se aplică un amestec care conține pulbere din *Langermannia gigantea*, ulei din *Rosae pingue* L. și ulei din *Plantago major* L., în următorul raport al componentelor, în % mas.:

pulbere din <i>Langermannia gigantea</i>	60...70
ulei din <i>Rosae pingue</i> L.	10...20
ulei din <i>Plantago major</i> L.	restul,

totodată uleiurile preventiv se iradiază cu raze ultraviolete cu lungimea de undă de 180 nm timp de 40 min, seria de tratament constituie 45 zile.

Datorită selectării reușite a ingredientelor acestei compozitii se obține un sinergism în acțiunea lor terapeutică, efectul terapeutic fiind net superior față de efectele fiecărui ingredient în parte, totodată prelucrarea preventivă a uleiului din *Rosae pingue* L. și uleiului din *Plantago major* L. amplifică acțiunile terapeutice ale acestora.

Aplicarea locală a pansamentului cu compoziția revendicată, conform observațiilor noastre, duce la absorbția moleculelor adezive aflate pe suprafața celulelor endoteliale, care se leagă selectiv cu anumite tipuri de leucocite (T-limfocite și macrofage). În afară de aceasta, pulberea din *Langermannia gigantea* leagă metabolismii toxicii, fermentii proteolitici și radicalii liberi care se elimină din leucocitele active, contribuie la diminuarea inflamației cronice și stimulează procesul de epitelizare a plăgilor. De asemenea se produce legarea fibrinei, polimerizarea căreia duce la formarea în jurul capilarelor a „manșetelor fibrinice”, ceea ce accelerează procesul necrobiotic, în felul acesta se ameliorează procesul de regenerare a celulelor și țesuturilor. De asemenea s-a observat că pulberea din

Langermannia gigantea are o acțiune antiinflamatoare, contribuie la dilatarea capilarelor și la ameliorarea circuitului sanguin și limfatic în țesuturile adiacente.

Avantajele metodei propuse sunt reducerea perioadei de tratament cu circa 3 luni față de soluția cea mai apropiată, totodată din punct de vedere economic compoziția aplicată este mai ieftină.

Metoda propusă se realizează în modul următor: plaga se prelucrează cu soluție antiseptică de apă oxigenată de 3%, apoi pe plagă se aplică un pansament îmbibat cu o compoziție care conține pulbere din *Langermannia gigantea*, ulei din *Rosae pingue L.*, *Plantago major L.*, în următorul raport al componentelor, în % mas.:

10	pulbere din <i>Langermannia gigantea</i>	60...70
	ulei din <i>Rosae pingue L.</i>	10...20
	ulei din <i>Plantago major L.</i>	restul,

totodată uleiurile preventiv se iradiază cu raze ultraviolete cu lungimea de undă de 180 nm timp de 40 min, seria de tratament constituie 45 zile.

Am observat că curățarea suprafetei plăgilor începe la a doua zi. În timpul pansamentului la a doua zi masele necrotice și fibrina se scot în formă de peliculă. La a 3...4-a zi apar granulații, încetează inflamația perifocală, se micșorează cantitatea de exsudat, se stimulează creșterea și maturizarea țesutului conjunctiv și epitelizarea ulcerelor trofice.

Metoda propusă a fost aplicată la 13 bolnavi. La toți bolnavii s-a produs epitelizarea, iar la 4 pacienți cu cangrenă la picior metoda revendicată a făcut posibilă prevenirea amputației membrului inferior. Perioada medie de tratament al bolnavilor a constituit 1...1,5 luni, în funcție de dimensiunile plăgilor, caracterul plăgilor, precum și de etiologia insuficienței venoase, ceea ce este cu mult mai puțin în comparație cu metoda descrisă în soluția ceea mai apropiată, care durează până la 4 luni.

Exemplu concret de realizare

25 Bolnava N, 58 ani, s-a adresat cu acuze la dureri insuportabile în regiunea planșe drepte cu eliminări necrotice purulente și cu miros putrid, în cadrul examinării clinice s-a depistat defectul pielii pe suprafața anteroară a planșei (12...16 cm), acoperit cu necroză, degetul IV necrotizat cu distrugere a țesutului osos al falangelor, edem până la treimea superioară a gambei cu hiperemie. Din plagă se elimină fibrină și mase necrotice. S-a efectuat însămânțarea la microfloră, s-a depistat *bacilul piocianic*. Pe baza anamnezei și a datelor obținute în cadrul examenului medical s-a stabilit diagnosticul: insuficiență circulatorie, boală ischemică a cordului, angină pectorală, boală hipertonică, diabet zaharat tip II, hepatita cronică, angiopatie diabetică, insuficiență venoasă a membrelor inferioare, gangrena planșei drepte. Până la aplicarea tratamentului conform metodei revendicate, pacienta s-a tratat în condiții de staționar în raion și de ambulatoriu timp de 5...6 luni, dar tratamentul a fost fără efect. S-a efectuat tratamentul conform metodei revendicate. Plaga a fost prelucrată cu soluție antiseptică de apă oxigenată de 3%, apoi pe plagă s-a aplicat un pansament îmbibat cu o compoziție care conține pulbere din *Langermannia gigantea*, ulei din *Rosae pingue L.* și *Plantago major L.*, în următorul raport al componentelor, în % mas.:

30	pulbere din <i>Langermannia gigantea</i>	60...70
	ulei din <i>Rosae pingue L.</i>	10...20
	ulei din <i>Plantago major L.</i>	restul,

35 40 uleiul din *Rosae pingue L.* și *Plantago major L.* preventiv a fost supus acțiunii razelor ultraviolete cu lungimea de undă de 180 nm, timp de 40 min.

Treptat pe suprafața plăgii a apărut granulație vie, edemul din jurul plăgii a dispărut, la periferia plăgii a apărut epitelizarea fină, de aceea s-a hotărât ca pansamentul cu compoziția dată să se aplice o dată în 2 zile. S-a continuat tratamentul timp de 8 zile, plaga s-a micșorat treptat în volum, din plagă a fost înlăturat țesutul osos al degetului IV. Treptat toată suprafața plăgii a fost acoperită cu o crustă subțire, care devinea tot mai groasă. S-a observat că porțiunea cutanată în jurul plăgii a devenit de culoare roz-pal, la palpare nu era dureroasă, inflamația periferică a dispărut și suprafața plăgii s-a epitelizat. Pacienta a evitat amputația membrului inferior drept. Pe parcursul următoarelor 3 luni recidive nu au apărut.

(56) Referințe bibliografice citate în descriere:

1. Савельев В. С. Болезни магистральных вен. Москва, Медицина, 1972, с. 421-423
2. RU 2174389 C2 2001.10.10
3. Скоринкина Л. Е., Поляков В. А., Тканевой имитатор кожи (колагеновая губка) в терапии трофических язв. Вестник дерматологии и венерологии, 1981, №5, с. 55-57

(57) Revendicări:

Metodă de tratament al ulcerului trofic, care constă în aceea că ulcerul trofic se prelucrează zilnic cu soluție de peroxid de hidrogen de 3%, apoi se aplică un amestec care conține pulbere din *Langermannia gigantea*, ulei din *Rosae pingue L.* și ulei din *Plantago major L.*, în următorul raport al componentelor, în % mas.:

pulbere din <i>Langermannia gigantea</i>	60...70
ulei din <i>Rosae pingue L.</i>	10...20
ulei din <i>Plantago major L.</i>	restul,

totodată uleiurile preventiv se iradiază cu raze ultraviolete cu lungimea de undă de 180 nm timp de 40 min, seria de tratament constituie 45 zile.

Director adjunct Departament:

GROSU Petru

Examinator:

IUSTIN Viorel

Redactor:

LOZOVANU Maria