



MD 4828 B1 2022.10.31

## REPUBLICA MOLDOVA



(19) Agenția de Stat  
pentru Proprietatea Intelectuală

(11) 4828 (13) B1

(51) Int.Cl: C12N 1/14 (2006.01)  
C12N 9/20 (2006.01)  
C12R 1/845 (2006.01)  
C12Q 1/34 (2006.01)  
C07F 3/04 (2006.01)  
C07F 15/06 (2006.01)  
C07D 213/79 (2006.01)

## (12) BREVET DE INVENȚIE

În termen de 6 luni de la data publicării mențiunii privind hotărârea de acordare a brevetului de invenție, orice persoană poate face opoziție la acordarea brevetului	
(21) Nr. depozit: a 2021 0070 (22) Data depozit: 2021.10.11	(45) Data publicării hotărârii de acordare a brevetului: 2022.10.31, BOPI nr. 10/2022
(71) Solicitanți: INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD	
(72) Inventatori: CILOCI Alexandra, MD; BULHAC Ion, MD; CLAPCO Steliană, MD; DANILESCU Olga, MD; DVORNINA Elena, MD; LABLIUC Svetlana, MD; MATROI Alexandra, MD; URECHE Dumitru, MD	
(73) Titulari: INSTITUTUL DE MICROBIOLOGIE ȘI BIOTEHNOLOGIE, MD; INSTITUTUL DE CHIMIE, MD	

(54) Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi *Rhizopus arrhizus* CNMN FD 03, producătoare de lipaze

## (57) Rezumat:

1

Invenția se referă la biotehnologie, și anume la un procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi *Rhizopus arrhizus* CNMN FD 03, producătoare de lipaze, și poate fi utilizată în industria microbiologică pentru producerea enzimelor lipolitice cu aplicare largă în industria alimentară, de producere și procesare a grăsimilor și uleiurilor vegetale, în medicină ca mijloc terapeutic și diagnostic.

Procedeul, conform invenției, prevede obținerea suspensiei de spori a tulpinii crescute timp de 30 de zile pe un mediu de malt agar, inocularea suspensiei în cantitate de 5% v/v

2

intr-un mediu nutritiv apăsor care conține, g/L: făină de soia - 35,0,  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  - 1,0,  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  - 5,0, cu adăugarea concomitentă a 0,010 g/L de  $[\text{Ca}(\text{L})_3][\text{Co}(\text{NCS})_4]$ , unde L - dimetilpiridin-2,6-dicarboxilat, și cultivarea la agitare continuă de 180-200 rot/min la temperatură de 28-30°C în decurs de 24 de ore.

Rezultatul invenției constă în sporirea biosintezei enzimelor lipolitice și reducerea duratei de cultivare a tulpinii cu 24 de ore.

Revendicări: 1

MD 4828 B1 2022.10.31

**(54) Process for submerged cultivation of *Rhizopus arrhizus* CNMN FD 03 fungus strain, producer of lipases**

**(57) Abstract:**

1

The invention relates to biotechnology, and in particular to a process for submerged cultivation of *Rhizopus arrhizus* CNMN FD 03 fungus strain, producer of lipases and can be used in the microbiological industry for obtaining lipolytic enzymes with wide application in the food industry, production and processing of fats and vegetable oils, in medicine as a therapeutic and diagnostic agent.

The process, according to the invention, provides for the preparation of a spore suspension of the strain grown for 30 days on a malt-agar medium, inoculation of the

2

suspension in an amount of 5 vol.% in a nutrient aqueous medium containing, g/L: soy flour - 35.0,  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  - 1.0,  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  - 5.0, with the simultaneous addition of 0.010 g/L of  $[\text{Ca}(\text{L})_3][\text{Co}(\text{NCS})_4]$ , where L - dimethylpyridine-2,6-dicarboxylate, and cultivation with continuous stirring at 180-200 rpm at the temperature of 28-30°C for 24 hours.

The result of the invention consists in increasing the biosynthesis of lipolytic enzymes and reducing the duration of cultivation of the strain by 24 hours.

Claims: 1

**(54) Способ глубинного культивирования штамма гриба *Rhizopus arrhizus* CNMN FD 03, продуцента липаз**

**(57) Реферат:**

1

Изобретение относится к биотехнологии, а именно к способу глубинного культивирования штамма гриба *Rhizopus arrhizus* CNMN FD 03, продуцента липаз, и может быть использовано в микробиологической промышленности для получения липолитических ферментов с широким применением в пищевой промышленности, производстве и переработке жиров и растительных масел, в медицине в качестве терапевтического и диагностического средства.

Способ, согласно изобретению, предусматривает получение суспензии спор штамма выращенного в течении 30 дней на

2

среде солод-агар, инокуляцию суспензии в количестве 5 об.% в питательную водную среду, содержащую, г/л: соевую муку - 35,0,  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  - 1,0,  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  - 5,0, с одновременным введением 0,010 г/л  $[\text{Ca}(\text{L})_3][\text{Co}(\text{NCS})_4]$ , где L - диметилпиридин-2,6-дикарбоксилат, и культивирование при постоянном перемешивания при 180-200 об/мин при температуре 28-30°C, в течение 24 ч.

Результат изобретения состоит в увеличении биосинтеза липолитических ферментов и сокращении продолжительности культивирования штамма на 24 часа.

П. формулы: 1

**Descriere:**

Invenția se referă la biotehnologie, în particular la un procedeu de cultivare submersă a 5 tulpinii de fungi *Rhizopus arrhizus* CNMN FD 03, producătoare de lipaze, și poate fi utilizată în industria microbiologică pentru obținerea lipazelor cu largi aplicări în industria alimentară, de producere și prelucrare a grăsimilor și uleiurilor vegetale, în medicină ca mijloc terapeutic și diagnostic.

Procedeele moderne de cultivare a tulpinilor fungice producătoare de enzime exocelulare 10 se bazează pe aplicarea rezultatelor cercetărilor clasice îmbinate cu realizările tehnologice și fizico-chimice moderne, precum studiul particularităților de creștere și sinteza a enzimelor în funcție de regimul termic, aerație, dinamica variației pH-ului mediului, raportul optim al componentelor mediilor nutritive, cantitatea și tipul materialului semincer, cât și screening-ul 15 inductorilor specifici reprezentanți de ingrediente naturale (faina de soia, faina de porumb, tărăte de grâu etc.). Componentele lipidice prezente în cantități mici în ingrediente din compoziția mediului stimulează efectiv biosintiza lipazelor (Рубан Е.Л. Микробные липиды и липазы. Наука, Москва, 1977, р. 132-156; Калунянц К.А., Голгер Л.И. Микробные ферментные препараты. Москва. Пищ. Пром., 1979, р. 14-30).

Pentru cultivarea submersă clasică a tulpinii *Rhizopus arrhizus* CNMN FD 03 este cunoscut procedeul, în care se utilizează un mediu nutritiv cu compoziția, g: faină de soia - 35,0; 20  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  -1,0;  $\text{KH}_2\text{PO}_4$ -1,0; apă potabilă până la 1L [1].

Dezavantajul constă în faptul că raportul componentelor mediului nu asigură biosintiza lipazelor la un nivel înalt, iar maxima biosintizei lipazelor se manifestă în ziua a 2-a de cultivare.

Se cunoaște de asemenea un procedeu de cultivare a tulpinii *Rhizopus arrhizus* CNMN FD 03 în aceleași condiții, timp de 48 ore, cu utilizarea în calitate de biostimulator a nanoparticulelor de  $\text{Fe}_3\text{O}_4$ , care asigură obținerea unei activități lipopolitice de 70190-125250 U/mL [2].

Deși aplicarea nanoparticulelor oferă soluții rapide și fabuloase în diverse domenii de activitate, inclusiv biotehnologii, impactul acestora asupra mediului și sănătății este imprevedibil, variind semnificativ (benefic sau toxic) de la caz la caz în funcție de caracteristicile nanomaterialelor și organismelor țintă, fiind dificil de prognosat și controlat. Totodată, 30 nanoparticulele pot suferi diferite transformări (inclusiv biotransformări), care modifică proprietățile fizico-chimice ale acestora, rezultând un impact asupra mediului diferit de cel pe care îl pot provoca nanoparticulele originale, fiind necesare evaluări individualizate costisitoare (Martínez G., Merinero M., Pérez-Aranda M., Pérez-Soriano E. M., Ortiz T., Begines B., Alcudia A. Environmental Impact of Nanoparticles' Application as an Emerging Technology: A Review. Materials (Basel, Switzerland), 2020, 14(1), p. 166).

Alt dezavantaj constă în faptul că deși activitatea lipopolitică este destul de înaltă, maxima de activitate a tulpinii de fungi miceliai *Rhizopus arrhizus* CNMN FD 03 se atinge în a doua zi de cultivare.

La unele microorganisme o parte considerabilă de lipaze exocelulare sunt legate de peretele 40 celular, ce poate inhiba secreția lipazelor în mediul de cultură și micșorarea randamentului lipazelor exocelulare. Includerea în mediul nutritiv a substanțelor cu abilități de stimulare a eliberării lipazelor legate de peretele celular, spre exemplu, surplusul de ioni ai unor metale, accelerează secreția lipazelor în mediul de cultură și favorizează procesul de sinteza a lipazelor exocelulare (Fogarty W.M. Микробные ферменты и биотехнология. Москва, Агропромиздат. 45 1986, p. 189-190).

În acest context un efect de stimulare a biosintizei lipazelor exocelulare poate asigura și includerea în mediul nutritiv a unor compuși coordinativi ai unor metale, în special ai metalelor cu rol de microelemente.

În ultimele decenii în scopul sporirii biosintizei enzimelor la micromicete intensiv se studiază compușii coordinativi ai elementelor 3d, din care unii s-au manifestat promițător în calitate de biostimulatori ai biosintizei enzimelor lipopolitice.

De exemplu, se cunoaște că utilizarea glioximatilor de Co(III) cu anioni de fluor [Co(DH)<sub>2</sub>(An)<sub>2</sub>]<sub>2</sub>[ZnF<sub>6</sub>]<sub>2</sub>·2H<sub>2</sub>O și [Co(DH)<sub>2</sub>(An)<sub>2</sub>]<sub>2</sub>[TiF<sub>6</sub>] în mediul nutritiv de cultivare a micromicetei *Rhizopus arrhizus* CNMN FD 03 în calitate de biostimulatori, asigură efect 55 stimulator din prima zi de cultivare, valorile activității lipopolitice constituind 5071-57500 U/mL în prima zi [3].

Deși biostimulatorul este activ, el nu este stabil la păstrare și coroziv în raport cu sticla datorită prezenței fluorului în anionul de hexafluorozirconat/titanat.

Cea mai apropiată soluție este procedeul de cultivare submersă tulpinii *Rhizopus arrhizus* CNMN FD 03, în care suspensia de spori a culturii crescute pe suprafețe înclinate de malț agar se inoculează într-un mediu nutritiv apos cu compoziția, g/L: faină de soia - 35,0,  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  - 1,0,  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  - 5,0, compusul coordinativ  $\text{CuGly}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$  - 0,010, utilizat în calitate de biostimulator al biosintizei lipazelor. Cultivarea se realizează în condiții de agitare continue (200 rot/min), timp de 48 ore, la temperatura de 28°C [4].

Dezavantajul constă în faptul că concentrația maximă admisibilă de aplicare a biostimulatorului  $\text{CuGly}_2 \cdot \text{H}_2\text{O}$  nu asigură biosinteză maximă a lipazelor, totodată maxima conținutului de lipaze în lichidul cultural de 58068 U/mL se atinge în a doua zi de cultivare.

Problema tehnică pe care o rezolvă invenția constă în elaborarea unui procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi *Rhizopus arrhizus* CNMN FD 03 care asigură sporirea capacitatei biosintetice a producătorului față de analogul proxim și reducerea duratei de cultivare.

Problema se rezolvă prin procedeul de cultivare submersă a tulpinii de fungi *Rhizopus arrhizus* CNMN FD 03, producătoare de lipaze, care prevede obținerea suspensiei de spori a tulpinii crescute timp de 30 de zile pe un mediu de malț agar înclinat, inocularea suspensiei în cantitate de 5% v/v într-un mediu nutritiv apos ce conține, g/L: faină de soia - 35,0,  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  - 1,0,  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  - 5,0, cu adăugarea concomitentă a 0,010 g/L de  $[\text{Ca}(\text{L})_3][\text{Co}(\text{NCS})_4]$ , unde L este dimetilpiridin-2,6-dicarboxilat, și cultivarea la agitare continuă de 180-200 rot/min la temperatura de 28-30°C în decurs de 24 de ore.

Rezultatul tehnic al invenției constă în sporirea biosintizei enzimelor lipopolitice în prima zi de cultivare și reducerea duratei de cultivare cu 24 de ore.

Rezultatele demonstrează că pe mediul cu biostimulatorul  $[\text{Ca}(\text{L})_3][\text{Co}(\text{NCS})_4]$  utilizat în concentrații de 0,005, 0,010 și 0,015 g/L, sporirea activității lipopolitice constituie 34,0-78,4% față de martor. Maxima de biosinteză a lipazelor la cultivare în condiții clasice constituie 34167 U/mL față de 34708-60958 U/mL în variantele experimentale, concentrația optimă fiind de 0,010 g/L. S-a relevat inclusiv faptul că activitatea variantelor experimentale deja în prima zi de cultivare prezintă valori ale activității lipopolitice superioare nivelului maxim al probei martor în ziua a 2-a de cultivare. În varianta cu concentrația optimă a compusului coordinativ de 0,010 g/L în prima zi de cultivare sporul activității lipopolitice este superior martorului zilei cu 93,5% și cu 78,4% față de valoarea maximă relevată la proba martor (34167 U/mL) în ziua a 2-a de cultivare, depășind totodată și mediul proxim cu 5% (60958 U/mL față de 58068 U/mL).

Creșterea activității lipopolitice în variantele experimentale poate fi condiționată de prezența cationilor cobaltului ( $\text{Co}^{2+}$ ) în compoziția complexului, care este cunoscut ca unul dintre microelemente cu rol biologic semnificativ pentru dezvoltarea organismelor. Sporirea rândamentului lipazelor exocelulare, parțial, poate fi atribuită compozitiei heterometalice a complexului utilizat, ce poate contribui la crearea unui surplus de ioni metalici cu efect de accelerare a secreției lipazelor în mediul de cultură ce favorizează procesul de sinteză a lipazelor exocelulare.

Avantajele invenției constau în obținerea de cantități sporite de enzime lipopolitice în termen redus.

## Exemple de realizare a invenției

### Exemplul 1

În prealabil se obține suspensia de spori a tulpinii de fungi prin spălare cu apă distilată sterilă a culturii de 30 de zile, crescută pe suprafețe înclinate de malț agar. Mediul nutritiv se prepară prin dizolvare într-un volum nu prea mare de apă potabilă a cantităților recântărite de săruri, urmată de dispersarea minuțioasă a făinii de soia, reieșind din raportul, g/L: faină de soia - 35,0;  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  - 5,0;  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  - 1,0. Apoi volumul de apă potabilă se aduce până la 1,0 L, pH-ul inițial al mediului - 8,0. Tulpina de fungi miceliali *Rhizopus arrhizus* CNMN FD 03 se cultivă în baloane Erlenmeyer cu capacitatea de 0,75 L, care conțin 0,2 L de mediu nutritiv. Mediul nutritiv se inoculează cu suspensie de spori și miceliu în cantitate de 5% v/v. Soluția apoasă de  $[\text{Ca}(\text{L})_3][\text{Co}(\text{NCS})_4]$  cu o concentrație bine determinată, care să asigure valori reieșind din intervalul 0,005-0,015 g/L, se agită discret timp de 2-5 minute pe baie de apă cu ultrasunet de tip DA-968 DADI nemijlocit înainte de utilizare, după care se adaugă la mediul nutritiv concomitent cu materialul semincer. Cultivarea se realizează în condiții de agitare continuă (200 rot/min) la temperatura de 28°C timp de 24 ore.

Activitatea lipopolitică maximală, determinată după gradul de hidroliză a suspensiei de ulei de măslini în alcool polivinilic până la acid oleic după metoda titrimetrică Otto-Iamada (Грачева И.М. §.а. Лабораторный практикум по технологии ферментных препаратов. Москва, Легкая и пищевая промышленности, 1982, p.75-76), în variantele experimentale cu aplicarea

# MD 4828 B1 2022.10.31

5 compusului coordinativ  $[Ca(L)_3][Co(NCS)_4]$  s-a marcat în prima zi de cultivare la concentrația de 0,010 g/L și constituie 60958 U/mL, față de 34167 U/mL maxima variantei control în ziua a doua de cultivare și față de 58068 U/mL în varianta proximă, depășind cu 78,4% proba control și cu 5% nivelul analogului proxim. Diferit de martor și analogul proxim, aplicarea compusului coordinativ reduce ciclul de cultivare a producătorului cu 24 de ore (vezi Tabelul).

Tabel

Influența compusului coordinativ de Ca asupra activității lipopolitice  
a tulpinii *Rhizopus arrhizus* CNMN FD 03

Compuși coordinativi	Conc., g/L	1-a zi		a 2-a zi	
		Activitatea, U/mL	%, față de martor	Activitatea, U/mL	%, față de martor
$[Ca(L)_3Co(SCN)_4]$	0,005	34708	110,2/101,6	43333	126,8
	0,010	60958	193,5/178,4/105,0*	51667	151,2
	0,015	45792	145,4/134,0	59167	173,2
Martor	-	31500	100,0	34167	100,0
Procedeul conform analogului proxim				58068±162	100,0

\*193,5/178,4/105,0- față de martorul zilei/față de maxima martorului (ziua a 2-a)/față de analogul proxim

10

Sinteză tetra(izotiocianato)cobaltat(II) de tris(dimetilpiridin-2,6-dicarboxilat)calcium

Amestecul mecanic din 0,05 g (0,025 mmol) de tiocianat de calciu tetrahidrat, 0,06 g (0,025 mmol) tiocianat de cobalt trihidrat și 0,15 g (0,075 mmol) de 2,6-piridindicarbonildiclorură intr-un raport molar de 1:1:3 a fost suspendat în 15 mL de metanol și refluxat timp de 3 ore. Toate componentele sunt solubile în alcool. Soluția formată are o culoare albastră-violetă. Amestecul s-a filtrat și s-a lăsat la temperatura camerei pentru cristalizare. Peste 24 de ore în soluție se formează cristale albastre de forma unor prisme, potrivite pentru analiza roentgenostructurală. Randamentul constituie 47% (0,11 g).

15

Găsit, %: C 40,57; H 2,88; Ca 4,45; Co 6,45; N 10,74.

20

Pentru:  $C_{31}H_{27}CaCoN_7O_{12}S_4$

calculat, %: C 40,61; H 2,97; Ca 4,37; Co 6,43; N 10,70.

Spectru IR ( $\nu, \text{cm}^{-1}$ ): 3089sl., 3010sl., 2957sl., 2901f.sl. 2095m., 2058f.p., 1709f.p., 1588p., 1463m., 1436p., 1424umăr., 1326f.p., 1271f.p., 1205m., 1179m., 1155m., 1083m., 1013m., 994p., 951m., 871m., 845m., 826m., 796f.sl., 756p., 731p., 693p., 658m., 540sl., 499umăr., 485umăr., 478m., 434m., 429m., 404m. (intensitatea relativă a benzilor de absorbție: f.p. - foarte puternică; p. - puternică; m. - medie; sl. - slabă).

25

Exemplul 2

În restul condițiilor echivalente exemplului 1, determinarea activității lipopolitice în lichidul cultural, obținut la cultivarea tulpinii la temperatura de 30°, maxima biosintezei în variantele experimentale cu aplicarea compusului coordinativ  $[Ca(L)_3][Co(NCS)_4]$  similar exemplului 1 s-a marcat în prima zi de cultivare în varianta cu concentrația de 0,010 g/L, constituind 58333 U/mL, față de 33333 U/mL maxima variantei control în ziua a doua de cultivare și față de 58068±162 U/ml în varianta analogului proxim, depășind cu 75,0% proba control și cu 0,5% nivelul analogului proxim.

30

Cercetările au fost efectuate în cadrul Proiectului Program de Stat 2020-2023 al Rep. Moldova cu cifrul 20.80009.5007.28 „Elaborarea noilor materiale multifuncționale și tehnologii eficiente pentru agricultură, medicină, tehnica și sistemul educațional în baza complecșilor metalelor “s” și „d” cu liganzi polidentați” cu finanțarea de către ANCD.

35

**(56) Referințe bibliografice citate în descriere:**

1. MD 2458 F1 2004.05.31
2. MD 4532 B1 2017.11.30
3. Чилочи А., Тюрина Ж., Клапко С., Stratan-Binzari M., Лаблюк С., Болога О., Коропчану Э., Rija A., Булхак И. Некоторые аспекты биосинтеза внеклеточных гидролаз микромицетов из родов *Rhizopus* и *Aspergillus* в присутствии комплексных соединений кобальта(III) с фторсодержащими анионами. Buletinul Academiei de Științe a Moldovei. Științele vieții, 2010, nr. 1(310), p. 121-128, regăsit în Internet la 20.06.2022, URL: <[https://ibn.ids.moldova.ro/vizualizare\\_articol/238](https://ibn.ids.moldova.ro/vizualizare_articol/238)>
4. MD 2709 F1 2005.02.28

**(57) Revendicări:**

Procedeu de cultivare submersă a tulpinii de fungi *Rhizopus arrhizus* CNMN FD 03, producătoare de lipaze, care prevede obținerea suspensiei de spori a tulpinii crescute timp de 30 de zile pe un mediu de malț agar înclinat, inocularea suspensiei în cantitate de 5% v/v într-un mediu nutritiv apos ce conține, g/L: făină de soia - 35,0,  $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$  - 1,0,  $\text{KH}_2\text{PO}_4$  - 5,0, cu adăugarea concomitentă a 0,010 g/L de  $[\text{Ca}(\text{L})_3][\text{Co}(\text{NCS})_4]$ , unde L este dimetilpiridin-2,6-dicarboxilat, și cultivarea la agitare continuă de 180-200 rot/min la temperatura de 28-30°C în decurs de 24 de ore.