

Metodă de tratament al infecției cu virusul SARS-CoV-2 de formă medie, care constă în aceea că se administrează *per os*, paracetamol 500 mg de 4 ori/zi, umifenovir 100 mg de 4 ori/zi, zilnic, timp de 5...7 zile, de asemenea se administrează cu 15...20 min înainte de masă, câte 50 ml de 3 ori/zi, timp de 15...21 de zile, o compoziție pe bază de alcool etilic de 96,4%, care conține extracte uscate din pelin negru (*Artemisia vulgaris*), cornet (*Xanthium strumarium*), rădăcină de maral (*Rhaponticum carthamoides*), coajă de nucă (*Juglans regia*), hrean (*Armoracia rusticana*), leuștean (*Levisticum officinale*), ginseng (*Panax ginseng*), pulbere de taxifolin și astaxanthin, în raport de 1:4-1:5, și apă purificată până la obținerea unei soluții alcoolice de 32...35%, în următorul raport al componentelor, în % mas:

extract din pelin negru	13±2
extract din cornet	10±2
extract din rădăcină de maral	10±2
extract din coajă de nucă	10±2
extract din hrean	10±2
extract din leuștean	10±2
extract din ginseng	11±2
pulbere de taxifolin	13±2
pulbere de astaxanthin	13±2
apă purificată	până la obținerea soluției alcoolice de 32...35%.