



1. Procedeu de preparare a unui compus oligomeric cu Formula (A):




în care n este un număr întreg de la 10 până la 40, și fiecare R^2 este independent pentru fiecare apariție, selectat din grupul constând din:




în care procedeul cuprinde etapele secvențiale de:

(a) punerea în contact a unui compus cu Formula (A1):



în care R^1 este un mediu suport și R^3 este selectat din grupul constând din tritil, monometoxitritil, dimetoxitritil și trimetoxitritil;


cu un agent de deblocare pentru a forma compusul cu Formula (II):



(II);

în care R^1 este un mediu suport;


(b) punerea în contact a compusului cu Formula (II) cu un compus cu formula (A2):



(A2);

în care R^3 este selectat din grupul constând din tritil, monometoxitritil, dimetoxitritil și trimetoxitritil;


pentru a forma un compus cu Formula (A3):




(A3);

în care R^1 este un mediu suport și R^3 este selectat din grupul constând din tritil, monometoxitritil, dimetoxitritil și trimetoxitritil;

(c) punerea în contact a compusului cu Formula (A3) cu un agent de deblocare pentru a forma un compus cu Formula (IV):





pentru a forma un compus cu Formula (A5):



(A5);

în care R¹ este un mediu suport și R³ este selectat din grupul constând din tritol, monometoxitritil, dimetoxitritil și trimetoxitritil; și
R⁴ este selectat dintre:






(b) efectuarea de $n-1$ iterații ale etapelor secvențiale ale:


(e1) punerea în contact a produsului format prin etapa imediat anterioară cu un agent de deblocare; și


(e2) punerea în contact a compusului format prin etapa imediat anterioară cu un compus cu Formula (A8):



(A8);


în care R^3 este selectat din grupul constând din tritil, monometoxitritil, dimetoxitritil și trimetoxitritil; și R^4 este independent pentru fiecare compus cu Formula (A8), selectat din grupul constând din:






și


(f) punerea în contact a compusului cu Formula (A9) cu un agent de deblocare pentru a forma un compus cu Formula (A10):




(A10);

în care n este un număr întreg de la 10 până la 40, R^1 este un mediu suport, și R^4 este independent pentru fiecare apariție, selectat din grupul constând din:







(g) punerea în contact a compusului cu Formula (A10) cu un agent de clivare pentru a forma un compus cu Formula (A11):



(A11);

în care n este un număr întreg de la 10 până la 40, și R⁴ este independent pentru fiecare apariție, selectat din grupul constând din:






și

(h) punerea în contact a compusului cu Formula (A11) cu un agent de deprotezare pentru a forma un compus oligomeric cu Formula (A).

2. Procedul din revendicarea 1, în care compusul cu Formula (A5) are Formula (A5a):




(A5a);

în care:


R¹ este un mediu suport;

R³ este selectat din grupul constând din tritil, monometoxitritil, dimetoxitritil și trimetoxitritil; și

R⁴ este selectat dintre:



3. Procedeu din revendicarea 1 sau revendicarea 2, în care compusul cu Formula (A8) are Formula (A8a):




(A8a);


în care:

R^3 este selectat din grupul constând din tritil, monometoxitritil, dimetoxitritil și trimetoxitritil; și

R^4 este, independent la fiecare apariție a compusului cu formula (A8a), selectat din grupul constând din:



4. Procedeu din oricare din revendicările 1-3, în care compusul cu Formula (A9) are Formula (A9a):



(A9a);

în care:


n este un întreg de la 10 până la 40,


R¹ este un suport-medi

R³ este selectat din grupul constând din tritol, monometoxitritil, dimetoxitritil


și trimetoxitritil; și

R⁴ este, independent la fiecare apariție, selectat din grupul constând din:





5. Procedul din oricare din revendicările 1-4, în care compusul cu Formula (A10) are Formula (A10a):




(A10a);

în care:


n este un întreg de la 10 până la 40,

R¹ este un mediu suport, și

R⁴ este, independent la fiecare apariție, selectat din grupul constând din:



6. Procedeu din oricare din revendicările 1-5, în care compusul cu Formula (A11) are Formula (A11a):





(A11a);

în care:


n este un întreg de la 10 până la 40, și

R^4 este, independent la fiecare apariție, selectat din grupul constând din:






(U),




(I), și



(PG).

7. Compus cu Formula (B1):



(B1);

sau o sare acceptabilă farmaceutică a acestuia

în care

R^{11} este selectat din grupul constând din halo, CN, și NO_2 ;

R^{12} este C_{1-6} -alchil;


R^{13} este H sau C_{1-6} -alchil; și

R^{14} este un prim linker legat de un mediu suport,

R^3 este selectat din grupul constând din tritil, monometoxitritil, dimetoxitritil și trimetoxitritil.


8. Compusul din revendicarea 7, în care compusul cu Formula (B1) are Formula

(I):



(I),

în care R^1 este un mediu suport.

9. Compus cu Formula (II-B):

(II-B);

sau o sare acceptabilă farmaceutic a acestuia
în care


R^{11} este selectat din grupul constând din halo, CN, și NO_2 ;

R^{12} este C_{1-6} -alchil;

R^{13} este H sau C_{1-6} -alchil; și


R^{14} este un prim linker legat de un mediu suport.

10. Compusul din revendicarea 9, în care compusul cu Formula (II-B) are Formula (II):



(II);

în care R^1 este un mediu suport.

11. Compus cu Formula (B3):

(B3);

sau o sare acceptabilă farmaceutic a acestuia
în care

w este selectat dintre O sau C;

t este 1, 2, 3, 4, sau 5;


R¹¹ este selectat din grupul constând din halo, CN, și NO₂;

R¹² este C₁₋₆-alchil;


R¹³ este H sau C₁₋₆-alchil;


R¹⁴ este un prim linker legat de un mediu suport;

R⁸ este selectat dintre:



în care R⁴ este selectat din grupul constând din:






și

R^3 este selectat din grupul constând din tritol, monometoxitritil, dimetoxitritil și trimetoxitritil.


12. Compusul din revendicarea 11, în care compusul cu Formula (B3) are Formula (III):




(III);

în care R^1 este un mediu suport.

13. Compus selectat dintre:



Si



în care:


n este un întreg de la 10 până la 40;

R^1 este un mediu suport;

R³ este selectat din grupul constând din tritil, monometoxitritil, dimetoxitritil

şı trimetoxitritil; şı

R^4 este, independent la fiecare apariție, selectat din grupul constând din:



R^1 este un mediu suport;

R^3 este selectat din grupul constând din tritil, monometoxitritil, dimetoxitritil și trimetoxitritil; și

R^4 este, independent la fiecare apariție, selectat din grupul constând din:

