

- 1.** Acetil-leucină sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia, pentru utilizare în tratarea sau prevenirea unei migrene sau a unuia sau mai multor simptome asociate cu aceasta.
- 2.** Acetil-leucină sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia, pentru utilizare conform revendicării 1, în care acetil-leucina sau sarea acceptabilă farmaceutic a acesteia reduce frecvența, ameliorează sau elimină unul sau mai multe simptome de migrenă selectate dintre cefalee, oboseală, aură, greață, vărsături, sensibilitate la lumină, sensibilitate la sunet, sensibilitate la miros, transpirație, concentrare slabă, senzație de căldură, senzație de frig, dureri abdominale și diaree,
- 3.** Acetil-leucină sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia, pentru utilizare conform revendicării 1 sau revendicării 2, în care acetil-leucina sau sarea acceptabilă farmaceutic a acesteia reduce, ameliorează sau elimină durerile de cap de migrenă sau este pentru utilizare în tratarea sau prevenirea unei aure, de preferință acetil-leucina sau sarea acceptabilă farmaceutic a acesteia este pentru utilizare în tratarea sau prevenirea unei aure asociate cu o durere de cap de migrenă sau pentru utilizare în tratarea sau prevenirea unei aure fără durere de cap de migrenă.
- 4.** Acetil-leucină sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia, pentru utilizare conform revendicării 1 sau 2, în care acetil-leucina sau sarea acceptabilă farmaceutic a acesteia reduce frecvența, ameliorează sau elimină unul sau mai multe simptome selectate dintre probleme vizuale sau tulburări vizuale, amorțeală sau furnicături, amețeli, probleme de echilibru, probleme motorii, dificultăți de vorbire și pierderea cunoștinței.
- 5.** Acetil-leucină sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia, pentru utilizare conform revendicării 1 sau revendicării 2, în care acetil-leucina sau sarea acceptabilă farmaceutic a acesteia este pentru utilizare în tratarea sau prevenirea unei migrene care nu este asociată cu o aură sau a unei migrene asociate cu o aură.
- 6.** Acetil-leucină sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia, pentru utilizare conform revendicării 1 sau revendicării 2, pentru utilizare în tratarea sau prevenirea unei migrene hemiplelice, a unei migrene hemiplelice sporadice, a unei migrene vestibulare, a unei migrene de tip bazilar sau a unei migrene retiniene.
- 7.** Acetil-leucină sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia, pentru utilizare conform revendicării 1 sau revendicării 2, în care acetil-leucina sau sarea acceptabilă farmaceutic a acesteia este pentru utilizare în tratarea sau prevenirea unei migrene care nu este o migrenă vestibulară; tratarea sau prevenirea unei migrene care nu este o migrenă vestibulară asociată cu simptome de vertij; tratarea sau prevenirea unei migrene care nu este asociată cu vertij sau simptome de vertij; și / sau tratarea sau prevenirea unei migrene care nu este asociată cu vertij acut sau vertij din cauza unei leziuni vestibulare periferice acute.
- 8.** Acetil-leucină sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia, pentru utilizare conform revendicării 1 sau revendicării 2, pentru utilizare în tratarea sau prevenirea migrenei cronice, a migrenei episodice, a unuia sau mai multor simptome prodromale asociate cu o migrenă, a durerii asociate cu o migrenă sau a unuia sau mai multor simptome postdromale asociate cu o migrenă.

9. Acetil-leucină, sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia, pentru utilizare conform oricăreia dintre revendicările precedente, în care acetil-leucina este sub formă racemică, sau acetil-leucina se află într-un exces enantiomeric al enantiomerului L sau într-un exces enantiomeric de enantiomerul D.

10. Acetil-leucină, sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia, pentru utilizare conform oricăreia dintre revendicările precedente, în care acetil-leucina, sau sarea acceptabilă farmaceutic a acesteia, este pentru administrare o dată pe zi, de două ori pe zi sau de trei ori pe zi.

11. Acetil-leucină sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia, pentru utilizare conform oricăreia dintre revendicările precedente, în care acetil-leucina sau sarea acceptabilă farmaceutic a acesteia, este pentru administrare pentru o durată de tratament de două săptămâni sau mai mult.

12. Acetil-leucină sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia, pentru utilizare conform oricăreia dintre revendicările precedente, în care acetil-leucina sau sarea acceptabilă farmaceutic a acesteia este pentru administrare într-o doză de la aproximativ 500 mg la aproximativ 15 g pe zi, de preferință acetil-leucina, sau sarea acceptabilă farmaceutic a acesteia, este pentru administrare într-o doză de la aproximativ 1500 mg la aproximativ 6000 mg pe zi, mai preferabil acetil-leucina sau sarea acceptabilă farmaceutic a acesteia, este pentru administrare într-o doză de la aproximativ 2500 mg până la aproximativ 5500 mg pe zi, chiar mai preferabil acetil-leucina sau sarea acceptabilă farmaceutic a acesteia, este pentru administrare într-o doză totală de aproximativ 3000 mg pe zi sau într-o doză totală de aproximativ 4500 mg pe zi, sau într-o doză totală de aproximativ 5000 mg pe zi, într-o doză totală de aproximativ 5500 mg pe zi.

13. Acetil-leucină sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia, pentru utilizare conform revendicării 12, în care acetil-leucina, sau sarea acceptabilă farmaceutic a acesteia, este pentru administrare într-o doză de 1500 mg de trei ori pe zi, preferabil trei comprimate de 500 mg pentru administrare de trei ori pe zi.

14. Acetil-leucină, sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia, pentru utilizare conform revendicării 12, în care acetil-leucina, sau sarea acceptabilă farmaceutic a acesteia, este pentru administrare într-o doză de patru comprimate de 500 mg și două doze de trei comprimate de 500 mg.

15. Acetil-leucină sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia, pentru utilizare conform revendicării 12, în care acetil-leucina sau sarea acceptabilă farmaceutic a acesteia, este pentru administrare în două doze de patru comprimate de 500 mg și o doză de trei comprimate de 500 mg.