


1. Un compus pentru utilizare în tratarea neoplasmelor mieloid/limfoide la un pacient care are nevoie de aceasta, în care compusul este Compusul 1 având formula:



Compusul 1,

în care neoplasmul mieloid/limfoid este sindrom mieloproliferativ 8p11.

2. Compusul pentru utilizare conform revendicării 1, în care neoplasmul mieloid/ limfoid este asociat cu eozinofilie.
3. Compusul pentru utilizare conform oricăreia dintre revendicările 1-2, în care Compusul 1 este administrat oral.
4. Compusul pentru utilizare conform oricăreia dintre revendicările 1-3, în care Compusul 1 este administrat o dată pe zi.
5. Compusul pentru utilizare conform oricăreia dintre revendicările 1-4, în care Compusul 1 este administrat într-o doză zilnică de aproximativ 5 mg până la aproximativ 20 mg.
6. Compusul pentru utilizare conform oricăreia dintre revendicările 1-4, în care Compusul 1 este administrat într-o doză zilnică de aproximativ 10 mg până la aproximativ 15 mg.
7. Compusul pentru utilizare conform oricăreia dintre revendicările 1-4, în care Compusul 1 este administrat într-o doză zilnică de aproximativ 13,5 mg.
8. Compusul pentru utilizare conform oricăreia dintre revendicările 1-7, în care Compusul 1 este administrat ca tabletă.
9. Compusul pentru utilizare conform revendicării 8, în care tableta cuprinde aproximativ 1 mg până la aproximativ 10 mg de Compusul 1.
10. Compusul pentru utilizare conform revendicării 8, în care tableta cuprinde aproximativ 1 mg până la aproximativ 5 mg de Compusul 1.
11. Compusul pentru utilizare conform revendicării 8, în care tableta cuprinde aproximativ 2 mg sau aproximativ 4,5 mg de Compusul 1.
12. Compusul pentru utilizare conform oricăreia dintre revendicările 1-11, în care Compusul 1 este administrat într-un regim de dozare de 21 de zile, în care regimul de dozare de 21 de zile cuprinde:
  - (a) o primă perioadă în care Compusul 1 este administrat o dată zilnic timp de 14 zile; și
  - (b) o a doua perioadă în care Compusul 1 nu este administrat timp de 7 zile.
13. Compusul pentru utilizare conform revendicării 12, în care:
  - (a) Compusul 1 este administrat într-o doză zilnică de aproximativ 5 mg până la aproximativ 20 mg în timpul primei perioade; sau
  - (b) Compusul 1 este administrat într-o doză zilnică de aproximativ 10 mg până la aproximativ 15 mg în timpul primei perioade; sau
  - (c) Compusul 1 este administrat într-o doză zilnică de aproximativ 13,5 mg în timpul primei perioade; sau
  - (d) Compusul 1 este administrat într-o doză zilnică de aproximativ 9 mg în timpul primei perioade.