

1. 5-Metoxi-N,N-dimetiltriptamină (5-MeO-DMT) sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia pentru utilizare în tratarea unui pacient care este diagnosticat cu tulburare depresivă majoră de către un profesionist autorizat în conformitate cu practica medicală acceptată.
2. 5-MeO-DMT sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia pentru utilizare ca în revendicarea 1, în care tulburarea este diagnosticată în conformitate cu manualul de diagnoză și statistică a tulburărilor mentale – ediția a cincea (DSM-5) publicat de Asociația Psihiatrică Americană.
3. 5-MeO-DMT sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia pentru utilizare ca în revendicările 1 sau 2, în care pacientul suferă de tulburare depresivă majoră moderată sau severă, cum s-a indicat printr-un scor pe scala de notare a depresiei Montgomery-Åsberg (MADRS) de 20 sau mai mare sau printr-un scor pe scala de notare a depresiei Hamilton cu 17 articole (HAM-D) de 17 sau mai mare.
4. 5-MeO-DMT sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia pentru utilizare ca în revendicarea 3, în care pacientul suferă de tulburare depresivă majoră severă cum s-a indicat printr-un scor MADRS de 35 sau mai mare sau printr-un scor HAM-D de 25 sau mai mare.
5. 5-MeO-DMT sau o sare acceptabilă farmaceutic a acesteia pentru utilizare ca în revendicările 1 până la 4, în care pacientul este diagnosticat cu o formă de tulburare depresivă majoră rezistentă la tratament.